
VADEMÉCUM

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉDICOS VETERINARIOS



ALPHA CHEM®

...¡ la calidad la hacemos todos los días !

EMPRESA CERTIFICADA EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
BPM
GOOD MANUFACTURING PRACTICE

Polivalentes ALPHA CHEM®

Pioneros en la formulación de fármacos con múltiples mecanismos de acción y sinergias, que dan como resultados: mayor actividad terapéutica, bienestar animal y optimización de los recursos.

Desarrollando y elaborando productos de calidad y alto valor terapéutico.

OBJETIVO:

Interrumpir el **CÍRCULO VICIOSO** de los procesos infecciosos e inflamatorios que afectan al animal y evitar mayores pérdidas económicas.

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS:

- Antibacteriano.
- Antiinflamatorio.
- Analgésico y Antipirético.
- Mucorregulador.
- Antioxidante y Protector Tisular.
- Antipirógeno.
- Inmunoestimulante.
- Incrementa el intercambio gaseoso a nivel alveolar.

VENTAJAS:

- Mayor acción terapéutica en condiciones de enfermedad severa.
- Pronta recuperación del animal y mayor rendimiento productivo.
- Menor estrés para el animal.
- Optimización de costos por concepto de uso de material y horas hombre.
- Optimiza y evita la sobredosificación y el uso excesivo de antibióticos.

Antibacteriano

Los Antibióticos presentes en los productos Polivalentes actúan a través de uno o más de los siguientes mecanismos de acción:


- Sobre la estructura de pared celular bacteriana (parte externa de la pared celular o directivamente en el citosol), ya sea produciendo lisis o interfiriendo su formación.
- Inhibiendo la síntesis de proteína en la fracción 50 S ribosomal.
- Afectando el metabolismo del ácido fólico.

Antiinflamatorio y Analgésico

La combinación de los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) presentes en la fórmula, permiten ampliar, complementar y reforzar la acción antiinflamatoria, analgésica y antipirético, inhibiendo las prostaglandinas mediadoras de la fiebre, tumoración y dolor a través de la inhibición de las ciclooxigenasas COX-1, COX-2 y COX-3 por diferentes mecanismos.

Antipirético

- Una vez que sucede la lisis bacteriana por el efecto de los antibióticos y del sistema inmune, cesa la producción de exotoxinas bacterianas, sin embargo quedan expuestas las endotoxinas ubicadas en la pared celular y compuestas por polisacáridos.
- Se considera que las exotoxinas son superantígenos, estos interactúan con los linfocitos T en un dominio que se encuentra fuera del sitio de reconocimiento antigénico normal, lo que resulta en el reclutamiento no especifico de una gran cantidad de los mismos (15 a 20% del total). Las exotoxinas también interactúan de manera sinérgica con las endotoxinas resultantes de la lisis bacteriana, estimulando una liberación desproporcionada de citocinas pro inflamatorias.
- A consecuencia de este "Segundo Proceso Inflamatorio" también se presentan síntomas como fiebre, postración, inapetencia, pérdida de peso, daño endotelial, extravasación capilar, dilatación vascular periférica, efectos indeseables de coagulación, microtrombos y depresión miocárdica. Dichos fenómenos pueden dar como resultado una difusión orgánica múltiple, shock y muerte. Estos fenómenos suceden de manera inmediata una vez que se lleva a cabo la infección y deben ser tratadas de manera simultánea e inmediatamente.



Mucorregulador e Inmunoestimulante

Es un fenómeno que implica varias acciones:

- **Expectoración**: estimula la actividad ciliar para la expulsión de las mucosidades del organismo y de los gérmenes patógenos, polvo, restos celulares etc., atrapados en este. Esta acción mantiene las vías respiratorias libres de obstáculos, debidamente humidificadas y protegidas contra agentes infecciosos y físicos por lo tanto permite una mejor actividad bronquial, con mayor flujo e intercambio gaseoso y una mejor oxigenación del organismo.
- **Mucogénesis**: incrementa la producción de las mucosubstancias y de IgA secretora al estimular las células productoras de las mismas.
- **Mucólisis**: disminuye la viscosidad de las secreciones de las mucosidades rompiendo las cadenas de glicoproteínas que las constituyen. Esto facilita las siguientes acciones, la expectoración de las mucosubstancias con su contenido dañino vía acción ciliar y permite que el antibiótico presente en la fórmula y las células de defensa penetren y actúen más fácilmente en el sitio de acción. Las acciones mucolíticas también pueden presentarse de manera muy importante en otros sistemas tales como el reproductor, digestivo y mamario.

Antioxidante y Protector Tisular

Las fórmulas **POLIVALENTES** tienen propiedades antioxidantes y neutralizan la acción de los radicales libre.

Una vez fagocitados los gérmenes y restos celulares por parte de los macrófagos se lleva a cabo un proceso oxidativo conocido como explosión respiratoria, produciendo especies reactivas de oxígeno (peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, óxido nítrico entre otras), con la finalidad de eliminar los patógenos fagocitados. A pesar de que es un importante proceso inmunológico de defensa, estas substancias oxidativas logran salir al exterior del macrófago y dañan células sanas de los tejidos circundantes.

Incrementa el intercambio gaseoso a nivel alveolar y mantiene la homeostasis pulmonar

Algunos de los vehículos presentes en la fórmula basados en fotolípidos específicos, actúan como substancias surfactantes pulmonares, además de activar a los neumocitos en la producción fisiológica de estas sustancias. Como consecuencia de estas acciones, habrá una mejor oxigenación del organismo en caso de afectaciones respiratorias.

Funciones de los Surfactantes:

- Reducen la tensión superficial dentro de los alveolos pulmonares previniendo el colapso pulmonar.
- Mejoran la ventilación / perfusión.
- Disminuye el retroceso elástico del pulmón.
- Mejoran la expansión alveolar.
- Actúan como barrera protectora de patógenos.
- Presenta actividad inmunomoduladora, estimulando la liberación de citoquinas.
- Favorece el transporte mucociliar.

Línea: POLIVALENTES

ZYTRA

Bromhexina | Guayacol | Paracetamol | Piroxicam

Solución oral | 250 mL | 1 L | 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Bromhexina clorhidrato ..... 10 mg
Guayacol ..... 20 mg
Paracetamol ..... 100 mg
Piroxicam ..... 15 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
ZYTRA se indica como promotor de los mecanismos naturales de defensa de los animales, para el tratamiento sintomático de enfermedades respiratorias que ocasionen inflamación, fiebre y dolor.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda y reproductores.
Porcinos.
Bovinos: productores de carne.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS: Administrar de 500 mL a 1 L de **ZYTRA** por cada 10 toneladas de peso corporal o 1000 L de agua de bebida; cada 24 h por 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO: Aves: carne 1 día. Porcinos: carne 2 días. Bovinos: carne 5 días.

Tratamiento signológico, mucorregulador, antiinflamatorio, expectorante y antipirético



Número de registro Q-7692-044

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



AEROTYL® TETRAVALENTE

Tilmicosina | Paracetamol | Bromhexina | Meloxicam

Solución inyectable | 25 mL | 100 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Tilmicosina base ..... 300 mg
Paracetamol ..... 100 mg
Bromhexina ..... 20 mg
Meloxicam ..... 15 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
AEROTYL® TETRAVALENTE está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio como complejo respiratorio bovino y neumonías, asociados a *Pasteurella* spp, *Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma* spp e *Histophilus somni*. Ver acciones terapéuticas Polivalentes.


ESPECIES DE DESTINO:
Ovinos.
Bovinos: productores de carne y leche (que no estén en producción).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Subcutáneo (SC).

DOSIS:
Administrar 1 mL de **AEROTYL® TETRAVALENTE** por cada 30 kg de peso corporal, dosis única. Bajo el criterio del Médico Veterinario se puede recomendar una segunda aplicación a las 48 h.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 28 días.

Terapia integral: antibiótico y mucorregulador



VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de Registro Q-7692-088

Línea: POLIVALENTES

FLORAN 400 TETRAVALENTE

Florfenicol | Paracetamol | Meloxicam | Bromhexina

Solución inyectable — 25 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Florfenicol ..... 400 mg
Paracetamol ..... 100 mg
Meloxicam ..... 5 mg
Bromhexina HCl ..... 5 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
FLORAN 400 TETRAVALENTE está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas asociadas a procesos inflamatorios, febriles y daño tisular severo. En **bovinos** es efectivo en el tratamiento de enfermedad respiratoria bovina, pododermatitis infecciosa y queratoconjuntivitis infecciosa bovina. En **porcinos**, se usa para el tratamiento de la enfermedad respiratoria porcina. Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: bovinos productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Porcinos: intramuscular (IM).
Bovinos: subcutánea (SC).

DOSIS:
Bovinos SC, **dosis única**. Administrar 1 mL de **FLORAN 400 TETRAVALENTE** por cada 10 kg de peso corporal. **Porcinos** IM, dosis única. Administrar 1 mL de **FLORAN 400 TETRAVALENTE** por cada 13.33 kg de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Bovinos** 38 días, **Porcinos** 21 días.

Antibiótico de amplio espectro, antipirético, antiinflamatorio y mucorregulador.

Acción sinérgica.



Número de Registro Q-7692-160

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

DOSIS ÚNICA DU ACCIÓN SINÉRGICA

FLORAN TRIVALENTE

Florfenicol | Paracetamol | Bromhexina

Solución inyectable — 100 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Florfenicol ..... 300 mg
Paracetamol ..... 100 mg
Bromhexhina HCl ..... 10 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES: **FLORAN TRIVALENTE** está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas asociadas a procesos inflamatorios, febriles y daño tisular severo. **Bovinos:** enfermedades respiratorias (*Pasteurella* spp, *Histophilus somni* y *Mycoplasma* spp), mastitis, septicemias, queratoconjuntivitis infecciosa bovina, pododermatitis y diarrea infecciosa. **Porcinos:** complejo respiratorio porcino, síndrome mastitis-metritis-agalactia, diarrea y enfermedades causadas por *Rickettsias* y *Chlamydia*. Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: intramuscular (IM) y subcutánea (SC).
Porcinos: intramuscular (IM).

DOSIS:
Bovinos aplique vía (IM), 1 mL de **FLORAN TRIVALENTE** por cada 15 kg de peso corporal, cada 48 h.
Porcinos aplique vía (IM), 1 mL de **FLORAN TRIVALENTE** por cada 30 kg de peso corporal, cada 48 h.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Bovinos** IM 28 días, SC 38 días, Leche 7 días.
Carne **Porcinos** 16 días.

Antibiótico de amplio espectro, antipirético, antiinflamatorio y mucorregulador.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de Registro Q-7692-047

FURCEF TRIVALENTE

Ceftiofur | Piroxicam | Bromhexina

Suspensión inyectable — 25 mL | 100 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Clorhidrato de ceftiofur ..... 50 mg
Bromhexina clorhidrato ..... 10 mg
Piroxicam ..... 50 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
FURCEF TRIVALENTE está indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas asociado a procesos inflamatorios y febriles como neumonías bacterianas (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis*), fiebre de embarque (*Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*), pododermatitis (*Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella melaninogenica*), así como mastitis, metritis, septicemias y heridas de manejo.
Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), subcutánea (SC).

DOSIS:
Bovinos administrar de 1 a 2 mL de **FURCEF TRIVALENTE** por cada 50 kg de peso corporal, cada 24 h por 3 días.
Porcinos administrar de 3 a 5 mL de **FURCEF TRIVALENTE** por cada 50 kg de peso corporal, cada 24 h por 3 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 4 días, **Bovinos** 3 días.
Leche no requiere.

Antibiótico de amplio espectro antiinflamatorio no esteroidal y expectorante

NUEVA PRESENTACIÓN 250 mL

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de Registro Q-7692-048

Línea: POLIVALENTES

MONOZUL *plus* INYECTABLE

Solución inyectable 25 mL 100 mL

Sulfamonometoxina | Trimetoprim | Paracetamol | Meloxicam | Bromhexina

FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Sulfamonometoxina ..... 20 g
Trimetoprim ..... 4 g
Paracetamol ..... 5 g
Meloxicam ..... 1.5 g
Bromhexina HCl ..... 1 g
Vehículo cbp ..... 100 mL

INDICACIONES:
MONOZUL *plus* INYECTABLE está indicado en:
Porcinos: neumonía enzoótica (*Pasteurella* spp, *Mycoplasma* spp), rinitis atrófica porcina (*Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*), colibacilosis (*E. coli*), *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, síndrome mastitis metritis agalactia (*E. coli*, *Klebsiella* spp), salmonelosis (*Salmonella* spp), toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*) y coccidiosis (*Isospora suis*, *Eimeria* spp).
Bovinos: neumonía enzoótica (*Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma* spp), neumonías bacterianas (*Bordetella* spp, *Pasteurella* spp), colibacilosis (*E. coli*), *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, mastitis (*E. coli*, *Klebsiella* spp), coccidiosis (*Isospora* spp, *Eimeria* spp), salmonelosis (*Salmonella* spp), toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*), difteria y pododermatitis (*Fusobacterium necrophorum*). Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda (IM).

DOSIS:
Administrar 1 mL de **MONOZUL plus INYECTABLE** por cada 20 kg de peso corporal, durante 3 a 5 días, cada 24 h.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 15 días, Leche 9 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Antibiótico, antiinflamatorio, antipirético y mucorregulador



Número de registro Q-7692-153

TRIACEF TRIVALENTE

Suspensión inyectable 100 mL

Ceftriaxona | Diclofenaco | Bromhexina

FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Ceftriaxona sódica equivalente a ..... 5 g de ceftriaxona base
Diclofenaco sódico ..... 2.5 g
Bromhexina HCl ..... 1 g
Vehículo cbp ..... 100 mL

INDICACIONES:
TRIACEF TRIVALENTE está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias, musculo-esqueléticas, septicemias y heridas de manejo asociadas a procesos inflamatorios, febriles y daño tisular severo (*E. colli*, *Klebsiella*, *Proteus Mannhemia hemolytica* y *Pasteurella multocida*). Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: productores de carne y leche.
Caprinos y Ovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM).

DOSIS:
Porcinos administrar 0.2 a 0.6 mL de **TRIACEF TRIVALENTE** por cada 10 kg de peso corporal, cada 24 h, durante 3 a 5 días.
Bovinos, Ovinos y **Caprinos** administrar de 0.2 a 0.4 mL de **TRIACEF TRIVALENTE** por cada 10 kg de peso corporal, cada 24 h, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne rumiantes 15 días, **Porcinos** 12 días. Leche 6 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Antibiótico, antiinflamatorio, analgésico y mucorregulador



Número de registro Q-7692-043

MONOZUL *plus*

Solución oral | 1 L | 5 L

Sulfamonometoxina | Trimetoprim | Paracetamol | Meloxicam | Bromhexina

FÓRMULA:
Cada 1000 mL contienen:
Sulfamonometoxina ..... 200 g
Trimetoprim ..... 40 g
Paracetamol ..... 50 g
Meloxicam ..... 15 g
Bromhexina HCl ..... 10 g
Vehículo cbp ..... 1000 mL

INDICACIONES: **MONOZUL *plus*** está indicado en:
Aves: pasteurelosis aviar (*Pasteurella multocida*), coriza infecciosa (*Haemophilus gallinarum*), enfermedad respiratoria crónica (*Mycoplasma gallisepticum*), estafilococosis (*Staphylococcus aureus*), salmonelosis (*Salmonella pullorum*), colibacilosis (*E. coli*), entre otras enfermedades de vías respiratorias, urinarias, gastrointestinales y coccidiosis (*Eimeria* spp).
Porcinos: neumonía enzoótica (*Pasteurella spp*, *Mycoplasma* spp), rinitis atrófica porcina (*Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*), colibacilosis (*E. coli*), *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, síndrome mastitis metritis agalactia (*E. coli*, *Klebsiella* spp), salmonelosis (*Salmonella* spp), toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*) y coccidiosis (*Isospora suis*, *Eimeria* spp).
Bovinos: neumonía enzoótica (*Mannheimia haemolytica*, *Mycoplasma* spp), neumonías bacterianas (*Bordetella* spp, *Pasteurella* spp), colibacilosis (*E. coli*), *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, mastitis (*E. coli*, *Klebsiella* spp), coccidiosis (*Isospora* spp, *Eimeria* spp), salmonelosis (*Salmonella* spp), toxoplasmosis (*Toxoplasma gondii*), difteria y pododermatitis (*Fusobacterium necrophorum*). Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: de engorda, reproductoras, progenitoras y postura comercial (cuando no estén en producción).
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: pre-rumiantes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 1 L de **MONOZUL *plus*** por cada 20,000 kg de peso corporal, equivalente a 0.5 mL de **MONOZUL *plus*** por cada 10 kg de peso corporal, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves** y **Porcinos** 11 días, **Bovinos** 15 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Antibiótico, antiinflamatorio, antipirético y mucorregulador



Número de registro Q-7692-095

TULA FLUX-D

Solución inyectable | 20 mL | 100 mL | 250 mL

Tulatromicina | Flunixin | Bromhexina | Desloratadina

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Tulatromicina ..... 100 mg
Flunixin ..... 80 mg
equivalente a 133 mg
de flunixin de meglumina
Bromhexina clorhidrato ..... 20 mg
Desloratadina ..... 2.85 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
TULA FLUX®-D está indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos (CRB) y porcinos (CRP) asociadas con *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*, *Mycoplasma bovis*; además de *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus suis* y *Staphylococcus aureus*.

También puede considerarse su uso para el tratamiento de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) asociada a *Moraxella bovis*.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos productores de carne y Porcinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Bovinos: subcutánea (SC).
Porcinos: intramuscular profundo (IM).

DOSIS:
Administrar una dosis única 2.5 mg de tulatromicina, 2 mg de flunixin de meglumina, 0.5 mg de bromhexina HCl y 0.07 mg de desloratadina por kg de peso corporal. Equivalentes a 1 mL de **TULA FLUX®-D** por cada 40 kg de peso corporal.

Puede aplicarse una segunda dosis, dependiendo de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne: Bovinos 49 días, Porcinos 33 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Antibiótico de amplio espectro



Número de registro Q-7692-181

Línea: Inyectables

FLUNIXIN

Flunixin de Meglumina 55 mg/mL

Solución inyectable | 25 mL | 100 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Flunixin ..... 55 mg
equivalente a 91.3 mg de flunixin de meglumina
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
FLUNIXIN está indicado en el tratamiento de procesos inflamatorios y febriles asociados a enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, gastrointestinal, genitourinario y musculoes-quelético. **FLUNIXIN** es una excelente opción en el tratamiento del dolor pre y post-quirúrgico, dolor visceral, endotoxemia, choque endotóxico, cólico, mastitis, metritis, agalactia, diarreas, laminitis y claudicaciones.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Caprinos y Ovinos: productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM) e intravenosa (IV).

DOSIS:
Bovinos administrar 1 - 2 mL de **FLUNIXIN** por cada 50 kg de peso corporal, cada 12 a 24 h, por 3 días.
Porcinos administrar 2 mL de **FLUNIXIN** por cada 50 kg de peso corporal, dosis única.
Caprinos y **Ovinos** administrar 1 - 2 mL de **FLUNIXIN** por cada 50 kg de peso corporal, cada 24 h.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 12 días, **Bovinos**, **Caprinos** y **Ovinos** 4 días. Leche 3 días.

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroidal



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de registro Q-7692-181

HEMO TRAT II

Hierro

Solución inyectable | 100 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Hierro dextrán equivalente a ..... 200 mg
de hierro elemental
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
HEMO TRAT II está indicado en el tratamiento y prevención de anemias causadas por carencia o deficiencia de hierro, o bien para estados anémicos a consecuencia de enfermedades infecciosas en lechones.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: Lechones.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM).

DOSIS:
Porcinos lechones de 2 a 4 días de edad, de 100 a 200 mg de hierro por animal, equivalente de 0.5 a 1 mL de **HEMO TRAT II**. Repetir tratamiento a los 14 - 21 días.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

Antianémico



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-177

PIRAX M

Paracetamol | Meloxicam

Solución inyectable | 100 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Paracetamol ..... 300 mg
Meloxicam ..... 15 mg
Vehículo cbp ..... 1 mg

INDICACIONES:
PIRAX M es una combinación sinérgica con acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica. Coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y febriles asociados a enfermedades infecciosas y de manejo.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), subcutánea (SC).

DOSIS:
Administrar 1 mL de **PIRAX M** por cada 30 kg de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO: carne **Porcinos** 5 días, **Bovinos** 15 días. Leche 5 días.

Interacción sinérgica antiinflamatoria



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-164

QUINOFLUX Enrofloxacina Flunixin Bromhexina

Solución inyectable | 25 mL | 100 mL | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Enrofloxacina ..... 150 mg
Flunixin ..... 44 mg
Bromhexina HCl ..... 10 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
QUINOFLUX está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas y micoplasmosis sensibles a la enrofloxacina, asociadas a procesos inflamatorios, febriles y daño tisular severo.
Porcinos: infecciones del aparato respiratorio (enfermedad respiratoria porcina, neumonía enzoótica y rinitis atrófica), digestivo (salmonelosis), reproductor (mastitis-metritis-agalactia), septicemias, anemia hemolítica, infecciones en piel y enfermedad de Glässer.
Bovinos: infecciones del aparato gastrointestinal (diarreas bacterianas), reproductor (mastitis, ureaplasmosis), respiratorio (neumonías, fiebre de embarque), septicemias, osteomielitis, artritis; infecciones en tejido tegumentario (abscesos, infecciones de ombligo) y heridas por manejo (descornes). Ver acciones terapéuticas Polivalentes.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), intravenosa (IV) y subcutánea (SC).

DOSIS:
Porcinos y Bovinos administrar 10 mL de **QUINOFLUX** por cada 200 kg de peso corporal, dosis única; repetir el tratamiento a las 72 h, si es necesario.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 13 días, **Bovinos** 28 días.
Leche 4 días.

Antibiótico de larga acción, antiinflamatorio y antioxidante

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



QUINAFLOXEN INY
Enrofloxacina 100 mg/mL

Solución inyectable | 250 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Enrofloxacina ..... 100 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
QUINAFLOXEN INY está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas y por mycloplasmas.
Porcinos: Complejo Respiratorio Porcino (*Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Glaesserella parasuis*, *Streptococcus suis*, *Bordetella bronchiseptica* y *Mycoplasma hyopneumoniae*). **Bovinos y Caprinos:** infecciones respiratorias (*Pasteurella* spp, *Histophilus somni*, *Staphylococcus* spp, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Bordetella* spp).

ESPECIES DE DESTINO:
Caprinos.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), intravenosa (IV) y subcutánea (SC).

DOSIS:
Caprinos, Porcinos, Bovinos administrar de 1 a 2 mL de **QUINAFLOXEN INY** por cada 40 kg de peso corporal, cada 24 h, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Bovinos** 28 días, **Porcinos** 5 días.

Antibiótico de amplio espectro

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Línea: Inyectables

BULAC ev®

Omeprazol 100 mg/mL

Polvo liofilizado para solución inyectable

Caja colectiva con 3 frascos con 1 g de omeprazol c/u + 3 frascos con 10 mL de diluyente c/u

FÓRMULA:
Cada frasco con polvo liofilizado contiene:
Omeprazol sódico equivalente a omeprazol ..... 1000 mg

Cada frasco con diluyente contiene:
Vehículo cbp ..... 10 mL

INDICACIONES:
BULAC ev® está indicado en el tratamiento en trastornos ácidos-pépticos, hipersecreción ácida y úlceras abomasales.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: pre-rumiantes. Bovinos productores de carne y leche (fuera de producción).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa (IV).

DOSIS:
Administrar 1 mL de **BULAC ev®** por cada 50 kg de peso corporal cada 24 h, durante 1 a 4 días.

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Inhibidor de la bomba de protones



BUSERELINA 4

Acetato de buserelina 4 µg/mL

Solución inyectable 20 mL Caja colectiva con 10 frascos de 20 mL c/u

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Acetato de buserelina equivalente a ..... 4 µg de buserelina base
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
La **BUSERELINA 4** está indicada en **Bovinos** para el tratamiento de quistes foliculares, aciclia y anestro. Así mismo se utiliza para la sincronización de la ovulación en programas de inseminación artificial. En **Porcinos** la **BUSERELINA 4** se utiliza para la inducción de ovulación.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: vacas.
Porcinos: reproductoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM) y subcutánea (SC).

TIEMPO DE RETIRO:
Bovinos de carne y porcinos 0 días.
Bovinos de leche 0 días.

DOSIS:

BOVINOS (VACAS) PADECIMIENTO/TRATAMIENTO	DOSIS µg/animal	Cantidad en mL
Sincronización de estro, atresia folicular.	10	2.5
Quiste folicular, aciclia.	20	5
Mejoramiento de fertilidad con ovulación retardada.	10	2.5
Incremento del índice de fecundidad en inseminación artificial o monta natural, repetir a los 11-12 días para evitar luteólisis.	10	2.5
PORCINOS (REPRODUCTORAS) PADECIMIENTO/TRATAMIENTO	**DOSIS µg/animal**	**Cantidad en mL**
Inducción de la ovulación.	10	2.5

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Análogo de la hormona liberadora de la gonadotropina



ESTRASIN

Cloprostenol 250 µg/mL

Solución inyectable | Caja colectiva con 10 frascos de 20 mL c/u

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Cloprostenol sódico equivalente a ..... 250 µg cloprostenol
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
ESTRASIN está indicado en el tratamiento de desórdenes reproductivos como anestro o subestro, sincronización del estro y ovulación; piometra, endometritis, expulsión de fetos momificados e inducción del parto o abortos, así como quistes del cuerpo lúteo.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: reproductoras.
Bovinos: productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular (IM).

DOSIS:
Bovinos administrar 2 mL de **ESTRASIN** por animal, en la tabla del cuello.
Porcinos administrar 0.7 mL de **ESTRASIN** por animal, 2 días antes de la fecha de parto.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Agente luteolítico



UTEREX L.A.

Carbetocina

Solución inyectable | Caja colectiva con 10 frascos de 20 mL c/u

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Carbetocina ..... 0.07 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
Vacas: atonía uterina, retención placentaria, loquiometra, expulsión del contenido patológico del útero en casos de aborto, piometra, edema en la membrana fetal, mastitis, estimulación del reflejo de eyección de leche y regulación de partos.
Cerdas: atonía uterina, retención placentaria, loquiometra, prevención y tratamiento del síndrome MMA, estimulación del reflejo de eyección de leche y sincronización del parto.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos (vacas) y **Porcinos** (cerdas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular profunda (IM).

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere.

DOSIS:
Vacas administrar 2.5 a 5 mL de **UTEREX L.A.**
Cerdas administrar 1.5 a 3 mL de **UTEREX L.A.**
Sincronización de partos en cerdas: administrar 0.7 mL de **UTEREX L.A.**

¡No requiere cadena fría!

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Análogo sintético hormonal de oxitocina con mayor actividad



Línea: Inyectables

TIAMULINA INYECTABLE

Fumarato hidrogenado de tiamulina 200 mg/mL

Solución inyectable — 100 mL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Fumarato hidrogenado de tiamulina ..... 200 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES: TIAMULINA INYECTABLE se indica para el tratamiento de *Mycoplasma Hyopneumoniae*, neumonía enzoótica causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella* spp; artritis causada por *Streptococcus suis*, disentería porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae*; enteropatía proliferativa asociada a *Lawsonia intracellularis*. Así mismo tiene acción contra *Erysipelothrix rhusiopathiae* y *Leptospira* spp.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM).

DOSIS:
Porcinos administrar 1 - 1.5 mL de **TIAMULINA INYECTABLE** por cada 20 kg de peso corporal, cada 24 h, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 14 días.

Antibiótico y antimycoplásmico



Número de registro Q-7692-179

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

TRIACEF INCUBADORA

Ceftriaxona 5 g

Polvo estéril inyectable — Caja con 2 frascos con 5 g c/u

No altera la potencia de la vacuna de Marek (Mantiene las UFP).

FÓRMULA:
Cada frasco contiene polvo estéril con:
Ceftriaxona sódica equivalente a ..... 5 g de ceftriaxona base
Para diluir en 100 mL

INDICACIONES: TRIACEF INCUBADORA está indicada en procesos infecciosos agudos, principalmente del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario; causadas por *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella* spp, *Streptococcus* spp y *Staphylococcus aureus*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de un día de edad (incubadora).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), Subcutánea (SC).

DOSIS:
Administrar 2 mg de ceftriaxona por kg de peso corporal, reconstituyendo únicamente con el diluyente de la vacuna de Marek. Equivalente a 0.2 mL de la solución obtenida por pollo.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMBINACIÓN DE TRIACEF INCUBADORA (5 g) CON LA VACUNA DE MAREK

1. Reconstituir un frasco de **TRIACEF INCUBADORA** de 5 g con 100 mL del diluyente de la vacuna de Marek.
2. Agregar **TRIACEF INCUBADORA** reconstituido al resto del diluyente de la vacuna de acuerdo al volumen que se utilizará, tal como se menciona en el siguiente cuadro:

Espere de 5 a 10 minutos antes de continuar para que la solución sea homogénea.
Dosis 2 mg de ceftriaxona por kg de peso corporal.

Capacidad del diluyente	Número de dosis	
Si utiliza diluyente de 800 mL	4000	Tomar 6.4 mL y reconstituir en los 800 mL
Si utiliza diluyente de 400 mL	2000	Tomar 3.2 mL y reconstituir en los 400 mL
Si utiliza diluyente de 200 mL	1000	Tomar 1.6 mL y reconstituir en los 200 mL

Dosis total/pollito: 0.08 mg; peso promedio vivo/pollito: 40 g.

3. Reconstituir la vacuna de Marek de la manera usual.
4. Continúe con el procedimiento de vacunación habitual. Aplique 0.2 mL de vacuna por pollito.

Un frasco de **TRIACEF INCUBADORA** de 5 g reconstituido con diluyente de la vacuna de Marek a 100 mL medica 62,500 pollitos.

Antibiótico de amplio espectro

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de registro Q-7692-165

PIRODOXAN *Dúo*

Polvo estéril para suspensión inyectable — 1 frasco con 6 g de polvo estéril
1 frasco con 22 mL diluyente

FÓRMULA:
El frasco con polvo estéril contiene:
Doxiciclina HCl ..... 3 g
Diaceturato de diminazeno ..... 2.1 g
Vitamina B12 ..... 0.001 g
Excipiente cbp ..... 6 g

El frasco con diluyente contiene:
Paracetamol ..... 3 g
Piroxicam ..... 0.09 g
Vehículo cbp ..... 22 mL

Una vez reconstituido, el volumen total es de 25 mL.

INDICACIONES:
PIRODOXAN *Dúo* está indicado para el tratamiento de Anaplasmosis producido por *Anaplasma marginale*, Piroplasmosis producido por *Babesia bigemina*, *B. bovis* y Tripanosomiasis por *Trypanosoma brucei*, así como el control de los efectos signológicos como dolor y fiebre. Coadyuva revirtiendo el estado anémico del animal.

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: bovinos productores de carne y/o leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular (IM).

MODO DE PREPARACIÓN: reconstituir el polvo con el total del diluyente y agitar vigorosamente.

DOSIS:
Administrar 25 mL de **PIRODOXAN *Dúo*** por hasta 300 kg a 400 kg de peso corporal como dosis única. En caso de ser necesario y de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario se puede aplicar una segunda dosis. Se recomienda no administrar el volumen total de **PIRODOXAN *Dúo*** en un solo sitio de aplicación.

Tiempo de retiro: carne 22 días, leche 6 días.

Tratamiento integral contra anaplasmosis y piroplasmosis

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de registro Q-7692-187

AEROTYL®

Tilmicosina 250 mg/mL

Solución oral 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Tilmicosina fosfato ..... 250 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
AEROTYL® está indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio como:
Porcinos complejo respiratorio porcino, rinitis atrófica, neumonías y artritis infecciosas, asociados a *Pasteurella* spp, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Mycoplasma* spp, así como enfermedades producidas por *Streptococcus* spp y *Staphylococcus* spp.
Aves enfermedades respiratorias asociadas a *Mycoplasmoides gallisepticum*; así como infecciones causadas por *Pasteurella* spp, *Escherichia coli* y *Ornithobacterium rhinotracheale*, así como enfermedades producidas por *Streptococcus* spp y *Staphylococcus* spp.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Aves: pollos de engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Porcinos de 15 a 20 mg de tilmicosina por kg de peso corporal, cada 24 h, durante 5 días.
Aves 15 mg de tilmicosina por kg de peso corporal, cada 24 h, durante 3 días.

Un litro de **AEROTYL®** medica 11 toneladas de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 7 días y **Aves** 12 días.

Antibiótico de amplio espectro y antimycoplásmico

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de Registro Q-7692-064

DOXIMINA

Doxiciclina hiclato 200 mg/mL

Solución oral 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Doxiciclina hiclato ..... 200 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
DOXIMINA está indicada para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, articulares, genitourinarias, septicemias y en procedimientos de manejo como despique y castraciones; causadas por bacterias Gram positivas, Gram negativas, *Mycoplasmoidales*, *Rickettsiaceae* y *Anaplasmataceae*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Porcinos y aves administrar de 10 a 20 mg por kg de peso corporal.
1 L de **DOXIMINA** medica de 10 a 20 toneladas de peso corporal, cada 24 h, durante 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Aves y Cerdos 7 días.

Antibiótico de amplio espectro

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Número de Registro Q-7692-037

Línea: Solubles

COCCI-KILL

Toltrazuril 25 mg/mL

Solución oral | 1 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Toltrazuril ..... 25 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
COCCI-KILL está indicado en aves domésticas para el tratamiento de trastornos entéricos asociados a coccidiosis subclínica o clínica, ocasionados por *Eimeria* spp (*E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella* y *E. brunetti*).

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 7 mg del toltrazuril por kg de peso corporal cada 24 h, durante 2 a 3 días. 1 L de **COCCI-KILL** 1 L medica 3.6 toneladas.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 16 días.

Coccidicida



Número de Registro Q-7692-083

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

KILL COCCI

Toltrazuril 50 mg/mL

Solución oral | 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Toltrazuril ..... 50 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
KILL COCCI está indicado en aves domésticas para el tratamiento de trastornos entéricos asociados a coccidiosis subclínica o clínica, ocasionados por *Eimeria* spp. (*E. acervulina*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. tenella* y *E. brunetti*).

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 16 días.

DOSIS:
Administrar 7 mg de toltrazuril/kg de peso corporal, equivalente a 1 L de **KILL COCCI** por cada 7.2 toneladas de peso corporal, cada 24 h, durante 2 a 3 días.

Coccidicida



Número de registro Q-7692-082

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

COCCIPLAN

Sulfacloropiridazina | Sulfaquinoxalina | Pirimetamina

Solución oral | 1 L | 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Sulfacloropiridazina ..... 36 mg
Sulfaquinoxalina ..... 36 mg
Pirimetamina ..... 9 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
COCCIPLAN está indicado en el tratamiento de coccidiosis causadas por *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. maxima* y *E. brunetti*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda y postura comercial.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 1 L de **COCCIPLAN** en 1000 L de agua de bebida, de manera continua durante 2 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 8 días, huevo 10 días.

Doble acción sinérgica secuencial

Antiprotozoario



Número de registro Q-7692-028

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

FLORAN 10

Número de Registro Q-7692-003

Florfenicol

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Florfenicol ..... 100 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

INDICACIONES: **FLORAN 10** está indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias y gastrointestinales en porcinos y aves, ocasionadas por bacterias sensibles al florfenicol como *Salmonella* spp, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp y bacterias de la familia *Pasteurellaceae*.

ESPECIES DE DESTINO: **Porcinos** crecimiento, desarrollo y reproductores.
Aves pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS: **Porcinos** administrar 1 L de **FLORAN 10** por cada 1000 L de agua de bebida o 5 toneladas de peso corporal. **Aves** administrar 20 mg de **FLORAN 10** por kg de peso corporal, cada 24 h, durante 2 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO: carne **Porcinos** 16 días, **Aves** 7 días.



Antibiótico de amplio espectro

FLORAN 20

Número de Registro Q-7692-192

Solución oral — 1 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Florfenicol ..... 200 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

INDICACIONES: en **Porcinos FLORAN 20** se indica en enfermedades del sistema respiratorio asociados a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis* y *Streptococcus suis*.
Aves en infecciones gastrointestinales y respiratorias causadas por *Actinobacillus* spp, *Pasteurella* spp, *Salmonella* spp, *Streptococcus* spp.

ESPECIES DE DESTINO: **Porcinos** crecimiento, desarrollo y reproductores.
Aves pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS: **Porcinos** administrar 1 L de **FLORAN 20** medica 10 toneladas de peso corporal. **Aves** administrar 1 L de **FLORAN 20** medica 7 toneladas de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO: carne: **Porcinos** 16 días, **Aves** 7 días.

FLOXIL®

Norfloxacina 300 mg/mL

Solución oral — 1 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Norfloxacina ..... 300 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
FLOXIL® está indicado en el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio, digestivo, urinario y tegumentario, asociados a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Escherichia coli*, *Pasterurella multocida*, *Klebsiella* spp, *Pseudomona* spp, *Bordetella bronchiseptica*, *Avibacterium paragallinarum* y bacterias de la familia *Metamycoplasmataceae*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Aves: administrar 1 L de **FLOXIL®** por cada 15 a 30 toneladas de peso corporal, durante 3 a 5 días. Para infecciones causadas por *Avibacterium paragallinarum* administrar 1 L de **FLOXIL®** por cada 15 toneladas de peso corporal, durante 3 a 5 días.
Porcinos: administrar 1 L de **FLOXIL®** por cada 17 a 20 toneladas de peso corporal, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 8 días, **Aves** 7 días.

Antibiótico de amplio espectro



Número de Registro Q-7692-091

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

FOSFOGRAN

Fosfomicina 100 mg/mL

Solución oral — 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Fosfomicina ..... 100 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
FOSFOGRAN está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas asociadas al aparato respiratorio, digestivo, músculo-esquelético, genitourinario, así como septicemias; causadas por bacterias como *Escherichia coli*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Salmonella* spp, *Leptospira* spp y bacterias de la familia *Pasteurellaceae*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda y postura comercial.
Porcinos: destete, crecimiento, desarrollo, finalización y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Aves administrar 1 L de **FOSFOGRAN**, que medica 10 toneladas de peso corporal, durante 3 a 5 días.
Porcinos administrar 1 L de **FOSFOGRAN**, que medica de 3.33 a 5 toneladas de peso corporal, durante 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** y **Aves** 5 días.
Huevo: 5 días.

Antibiótico de amplio espectro



Número de Registro Q-7692-025

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Línea: Solubles

PIRAX

Paracetamol | Piroxicam

Solución oral — 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Paracetamol ..... 100 mg
Piroxicam ..... 5 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
PIRAX es una combinación sinérgica con acción antiinflamatoria, antipirética y analgésica; coadyuvante en el tratamiento de procesos inflamatorios y febriles asociados a enfermedades infecciosas y de manejo.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda y reproductoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 1 L de **PIRAX** que medica 10 toneladas de peso corporal, cada 24 h, por 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 5 días.

Antiinflamatorio, Analgésico y Antipirético



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-062

NEUMOMYC AQUA

Clindamicina | Doxiciclina

Solución oral — 5 L

FÓRMULA:
Cada 1000 mL contienen:
Clorhidrato de clindamicina equivalente a ..... 40 g de clindamicina base
Doxiciclina hiclato equivalente a ..... 50 g de doxiciclina base
Vehículo cbp ..... 1000 mL

INDICACIONES:
NEUMOMYC AQUA está indicado para el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario.
Aves: *Avibacterium paragallinarum*, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Campylobacter* spp, *Clostridium perfringens*, *Mannheimia haemolytica*, *Bordetella avium*, *Mycoplasmoides gallisepticum*, *Mycoplasmopsis synoviae* y *Micoplasmopsis meleagridis*. **Porcinos:** *Actinobacillus pleuropneumonie*, *Glaesserella parasuis*, *Mannheimia haemolytica*, *Streptococcus suis*, *Bordelella bronchiseptica*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Lawsonia intracellularis* y *Mesomycoplasma hyopneumoniae*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollo de engorda.
Porcinos: crecimiento y desarrollo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 4 mg de clindamicina y 5 mg de doxiciclina por cada kg de peso corporal cada 24 h durante 3 a 5 días.

NEUMOMYC AQUA (litros)	Animales para medicar (kg de peso corporal)
1	10,000
5	50,000
10	100,000
20	200,000

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves** 5 días, **Porcinos** 8 días.

Antibiótico de amplio espectro y antimycoplásmico



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-184

QUINAFLOXEN 20

Enrofloxacina 200 mg/mL

Solución oral — 1 L — 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Enrofloxacina ..... 200 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
QUINAFLOXEN 20 está indicado en el tratamiento de infecciones bacterianas y micoplasmosis, sensibles a la enrofloxacina como: *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella sp*, *Staphylococcus sp*, *Streptococcus sp*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Mycoplasma* spp.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 5 días.

DOSIS:
Administrar 500 mL de **QUINAFLOXEN 20**, que medican de 5 a 10 toneladas de peso corporal, durante 3 a 7 días. Administre 500 mL de **QUINAFLOXEN 20** por cada 1000 L de agua de bebida.

Antibiótico de amplio espectro y antimycoplásmico



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de registro Q-7692-077

TIAMULINA SOLUCIÓN ORAL

Fumarato hidrogenado de Tiamulina 200 g/1000 mL

Solución oral | 5 L

FÓRMULA:
Cada 1000 mL contienen:
Fumarato hidrogenado de tiamulina ..... 200 g
Vehículo cbp ..... 1000 mL

INDICACIONES:
TIAMULINA SOLUCIÓN ORAL está indicada:
Aves: en el tratamiento de micoplasmosis producida por *Mycoplasmoides gallisepticum* y *Mycoplasmopsis synoviae*; e infecciones asociadas a *Streptococcus* spp y *Clostridium perfringens*.
Porcinos: se indica para el tratamiento de neumonía enzoótica producida por *Mesomycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella* spp; artritis causada por *Streptococcus suis* y *Mesomycoplasma hyorhinis*; disentería porcina asociada a *Brachyspira hyodysenteriae*, *Bacteroides fragilis*; enteropatía proliferativa asociada a *Lawsonia intracellularis*. Así mismo tiene acción contra *Brachyspira pilosicoli*, *Erysipelothrix rhusiopathiae* y *Leptospira* spp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, gallinas de postura y reproductoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

DOSIS:
Administrar 1 L de **TIAMULINA SOLUCIÓN ORAL**, equivalente a 20 mg de tiamulina por kg de peso corporal; que medican 10 toneladas de peso corporal; cada 24 h por 5 días.

ADVERTENCIAS:
No administrar junto con ionóforos ya que es extremadamente tóxico.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves** y **Porcinos** 7 días.
Huevo 0 días.

Antibiótico y antimycoplásmico

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



TILOFOX 10-10

Fosfomicina | Tilosina

Solución oral | 5 L

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Fosfomicina ..... 100 mg
Tilosina ..... 100 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
TILOFOX 10-10, está indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias, urinarias y gastrointestinales en porcinos y aves; asociados a *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Glaesserella parasuis*, *Streptococcus* spp, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus* spp, *Mycoplasmoides gallisepticum* y *Metamycoplasma hyosynoviae*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reemplazo y reproductoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 3 días.

DOSIS:
Aves: administrar 1 L de **TILOFOX 10 - 10** que medica 10 toneladas de peso corporal, durante 5 a 7 días.
Porcinos: administrar 1 L de **TILOFOX 10 - 10** medica 6.6 toneladas de peso corporal durante 5 a 7 días.

Combinación sinérgica antimicrobiana

VER INSTRUCTIVO DIGITAL



Línea: Solubles

VARMECTIN 1%

Ivermectina

VARMECTIN 2%

Ivermectina

Solución oral | 1 L

Antiparasitario de amplio espectro



FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Ivermectina ..... 10 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
VARMECTIN 1% está indicado para el tratamiento de parásitos internos como nematodos y cestodos; y de parásitos externos como ácaros y piojos en estados larvarios y maduros. Como: *Ascaridia* spp, *Capillaria* spp, *Dermanyssus* spp y *Ornithonyssus* spp, entre otros.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: de postura, reemplazo y engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 500 mL de **VARMECTIN 1%** por cada 12.5 a 25 toneladas de peso corporal. Se sugiere repetir el tratamiento 15 días después de la primera aplicación.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 15 días, huevo 17 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Ivermectina ..... 20 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
VARMECTIN 2% está indicado para el tratamiento de parásitos internos como nematodos y cestodos; y de parásitos externos como ácaros y piojos en estados larvarios y maduros. Como: *Ascaridia* spp, *Capillaria* spp, *Dermanyssus* spp y *Ornithonyssus* spp, entre otros.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: de postura, reemplazo y engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el agua de bebida.

DOSIS:
Administrar 10 mL de **VARMECTIN 2%** por cada tonelada de peso corporal. Se sugiere repetir el tratamiento 15 días después de la primera aplicación.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne 7 días.

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

ZURACOL®

Toltrazuril 50 mg/mL

Solución oral | 250 mL | 1 L

Antiprotozoario

VER INSTRUCTIVO DIGITAL





FÓRMULA:
Cada mL contiene:
Toltrazuril ..... 50 mg
Vehículo cbp ..... 1 mL

INDICACIONES:
ZURACOL® está indicado en la prevención y tratamiento de coccidiosis subclínica y clínica (*Eimeria* spp, *Isospora* spp), e infecciones causadas por protozoarios.

ESPECIES DE DESTINO:
Becerros, **lechones** y **corderos**.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO).

DOSIS:
Lechones y corderos administrar 1 mL de **ZURACOL®** por cada 2.5 kg de peso corporal; dosis única.
Becerros administrar 3 mL de **ZURACOL®** por cada 10 kg de peso corporal, cada 24 h, de 1 a 6 días.

TIEMPO DE RETIRO: carne 70 días.

CTC PM

Clortetraciclina

Polvo oral — 25 kg

FÓRMULA:
Cada 1000 gramos contienen:
Clorhidrato de clortetraciclina ..... 200 g
Excipiente cbp ..... 1000 g

INDICACIONES:
CTC PM está indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias, gastrointestinales, diarreas bacterianas, enteritis, septicemias, abscesos, pododermatitis, anaplasmosis, sinovitis y en la prevención de abortos asociadas a *Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp, *Clostridium* spp, *Brucella* spp, *Bordetella* spp, *Actinomyces* spp, *Bacillus* spp, *Listeria* spp, *Haemophilus* spp, *Pasteurella* spp (fiebre de embarque), *Klebsiella* spp, *Corynebacterium* spp, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Chlamydia* spp, *Micoplasma* spp, *Actinobacillus* spp, *Ehrlichia* spp y *Anaplasma* spp.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, gallinas de postura y reproductoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: productores de carne y leche.
Ovinos y Caprinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), mezclado en el alimento.

DOSIS:
Aves administrar 1 kg de **CTC PM** que medica 8,000 kg de peso corporal.
Porcinos y Bovinos administrar 1 kg de **CTC PM** medica de 10,000 a 20,000 kg de peso corporal.
Ovinos y Caprinos administrar 1 kg de **CTC PM** medica 9,100 kg de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves**, **Porcinos** y **Bovinos** 7 días.
Ovinos y **Caprinos** 4 días.
Huevo 0 días.

Antibiótico de amplio espectro



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-159

FLORAN PM 4%

Florfenicol

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Florfenicol ..... 40 g
Excipiente cbp ..... 1000 g

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

INDICACIONES:
FLORAN PM 4% está indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en porcinos asociadas a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* y *Salmonella cholerasuis*. En aves ocasionadas por *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp y *Avibacterium paragallinarum*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: de engorda, reproductoras, progenitoras y postura comercial.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral (PO), mezclado en el alimento.

DOSIS: **Porcinos** y **Aves** administrar de 1 a 2 kg de **FLORAN PM 4%** por tonelada de alimento durante 5 a 7 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Porcinos** 16 días, **Aves** 7 días.

Número de Registro Q-7692-087

FLORAN PM 10%

Florfenicol

Polvo oral — 20 kg



Antibiótico de amplio espectro

FÓRMULA:
Cada g contienen:
Florfenicol ..... 100 mg
Excipiente cbp ..... 1 g

VER INSTRUCTIVO DIGITAL

INDICACIONES:
FLORAN PM 10% está indicado en el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en porcinos asociadas a *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus suis* y *Salmonella cholerasuis*. En aves ocasionadas por *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp y *Avibacterium paragallinarum*.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: de engorda, reproductoras, progenitoras y postura comercial.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral (PO), mezclado en el alimento.

DOSIS: **Porcinos** 1 kg de **FLORAN PM 10%** medica 7 toneladas de peso corporal, por 5 a 7 días. **Aves** 1 kg de **FLORAN PM 10%** medica 3.5 toneladas de peso corporal, por 5 a 7 días.

TIEMPO DE RETIRO: carne **Porcinos** 16 días, **Aves** 7 días.

Número de Registro Q-7692-092

MOXILAN 50

Amoxicilina trihidratada 500 g/1000 g

Polvo oral — 10 kg

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Amoxicilina trihidratada ..... 500 g
Excipiente cbp ..... 1000 g

INDICACIONES:
MOXILAN 50 está indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias, digestivas, genitourinarias, cutáneas; en aves y cerdos ocasionados por microorganismos susceptibles a la fórmula.
Aves: enfermedades respiratorias, coriza, sinusitis, clostridiasis, artritis, salmonelosis, colibacilosis y estafilococosis.
Porcinos: enfermedad de Glässer (*Glaesserella parasuis*), meningitis bacteriana (*Streptococcus suis*), actinobacilosis, síndrome metritis mastitis agalactia, nefritis, cistitis y dermatitis.

ESPECIES DE DESTINO:
Porcinos: desarrollo y crecimiento.
Aves: pollos de engorda.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), en el alimento.

DOSIS:
Porcinos administrar de 0.5 - 1 kg de **MOXILAN 50** por tonelada de alimento, cada 24 h, durante 5 a 7 días.
Aves administrar de 0.5 - 1 kg de **MOXILAN 50** por tonelada de alimento, cada 24 h, durante 5 a 7 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves** 7 días, **Porcinos** 15 días.

Antibiótico



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-076

Línea: Premezclas

TETRAMICINA PM 50

Oxitetraciclina 500 g/1000 g

Polvo oral | 10 kg

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Oxitetraciclina HCl equivalente a ..... 500 g
de oxitetraciclina base
Excipiente cbp .....1000 g

INDICACIONES: TETRAMICINA PM 50 está indicada en el tratamiento de:
Bovinos; fiebre de embarque, neumonías (*Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, e Histophilus somni*), enteritis bacterianas (*Salmonella* sp, *Escherichia coli*), lengua de madera (*Actinobacillus lignieresii*), difteria (*Fusobacterium necrophorum*), *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp y *Anaplasma marginale.*
Porcinos; enteritis bacteriana (*E. coli*, *Salmonella sp*), leptospirosis (*Leptospira* sp), rinitis atrófica porcina (*P. multocida* y *B. bronchiseptica*).
Aves; enteritis bacteriana (*E. coli, Salmonella* sp), cólera aviar (*Pasteurella* sp), sinovitis (*Mycoplasma synoviae*).

ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos: becerros, productores de carne y leche.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Aves: pollos de engorda, gallinas de postura y reproductoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO), en el alimento.

DOSIS:
Bovinos y porcinos administrar 1 kg de **TETRAMICINA PM 50** medica 23 toneladas de peso corporal, por 7 a 14 días.
Aves administrar de 200 g a 1 kg de **TETRAMICINA PM 50** por tonelada de alimento, por 7 a 14 días.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Bovinos** y **Porcinos** 5 días. **Aves** 7 días.
Leche 8 días y huevo 4 días.

Antibiótico de amplio espectro



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-180

TIAM CTC

Tiamulina | Clortetraciclina

Polvo oral | 20 kg

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Fumarato hidrogenado de tiamulina ..... 100 g
Clorhidrato de clortetraciclina
equivalente a ..... 110 g
de clortetraciclina base
Excipiente cbp ..... 1000 g

INDICACIONES:
TIAM CTC está indicado en el tratamiento de infecciones gastrointestinales y respiratorias en aves y porcinos, asociados a *Mycoplasma* spp, *E. coli*, *Actinomyces* spp, *Bacillus anthracis*, *Clostridium* spp, *Listeria* spp, *Salmonella* spp, *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Leptospira* spp; así como en el tratamiento de ileítis causada por *Lawsonia intracellularis* y *colitis*.


ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, gallinas de postura y reproductoras.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral (PO), mezclado en el alimento.

DOSIS:
Aves y **Porcinos** administrar de 1 a 2 kg de **TIAM CTC** por tonelada de alimento. Durante 5 a 14 días, cada 24 h. 1 kg de **TIAM CTC** medica 11 toneladas de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne **Aves** y **Porcinos** 7 días.
Huevo 0 días.

Combinación sinérgica



VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-054

VARMECTIN PM

Ivermectina 6 g/1000 g

Polvo oral | 20 kg

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Ivermectica ..... 6 g
Excipiente cbp ..... 1000 g

INDICACIONES:
VARMECTIN PM está indicado para el tratamiento de parásitos internos como nematodos y de parásitos externos como ácaros y piojos en estados larvarios y maduros.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves: pollos de engorda, reproductoras, progenitoras y postura comercial.
Porcinos: crecimiento, desarrollo y reproductores.
Bovinos: productores de carne y leche.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO), en el alimento.

DOSIS:
Aves: administrar a 1 kg de **VARMECTIN PM** por cada 7.5 a 30 toneladas de peso corporal, durante 10 a 14 días.
Porcinos: administrar 1 kg de **VARMECTIN PM** por cada 20 a 60 toneladas de peso corporal, durante 7 días.
Bovinos: administrar 1 kg de **VARMECTIN PM** por cada 30 toneladas de PC, dosis única.

TIEMPO DE RETIRO:
Carne en aves 12 días, porcinos 5 días, bovinos 24 días. Huevo 6 días y Leche 28 días.

Antiparasitario de amplio espectro




VER INSTRUCTIVO DIGITAL

Número de Registro Q-7692-022

¿Desea saber más de nuestros productos?

www.alphachem.mx



...¡ la calidad la hacemos todos los días !

Atención personalizada:

55 1754 9682
grandes.especies@alphachem.com.mx

55 5092 6002
ger.sur@alphachem.com.mx

DESCARGA LA VERSIÓN DIGITAL

alphachemoficial

alphachem.oficial

ADVERTENCIAS GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS:

- La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

V2