ALPHACHEM®

...¡ la calidad la hacemos todos los días !

LÍNEA EQUINOS

GUIA RÁPIDA DE PRODUCTOS





INFORMACIÓN EXCLUSIVA
PARA MÉDICOS VETERINARIOS

Índice



AKTIV PRO® 1



KARBAMOL® 7



CARPROFEN® 2



KARBAMOL® *Pasta* ... 8



EUGASTRIL EQ® 3



MIRAN® *Pasta* 9



FLUNIXIN® 4



PERLIDE® 10



HEMOTAM® 5



TETRACEF® EQ 11



NUEVO PRODUCTO

FIROCOX EQ® 6



VILAIN® 12

ALPHACHEM®

...¡ la calidad la hacemos todos los días !

ALPHA CHEM® ofrece una línea especializada de productos farmacéuticos equinos, elaborados para el apoyo y tratamiento personalizado de las principales necesidades clínicas del caballo.

Nuestras formulaciones destacan por la innovación y adaptación individual, permitiendo al veterinario ajustar cada terapia a la condición de su paciente.

Además, integramos tecnología **ODS** orodispersable, utilizada en tabletas para mejorar la administración oral y facilitar el manejo terapéutico en equinos.

TECNOLOGÍA ODS Orodispersable

El portafolio **ALPHA CHEM®** abarca medicamentos para dolor, inflamación, movilidad articular, protección gástrica, recuperación deportiva y terapias dirigidas a alteraciones endocrinas, brindando soluciones de calidad para caballos de alto rendimiento y diversas actividades equinas.

Con respaldo profesional y calidad en cada producto, **ALPHA CHEM®** impulsa una medicina veterinaria moderna y flexible



ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Caja con 4 frascos de 8 mL c/u

Número de registro Q-7692-307

AKTIV PRO®

Pentosán polisulfato sódico 250 mg/mL

Modificador estructural del Cartílago Articular

SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
AKTIV PRO® está indicado para el tratamiento de la osteoartritis y otros padecimientos degenerativos de las articulaciones de los caballos, en programas para pacientes reincidentes a la osteoartritis y en animales de alto rendimiento previo a competencia y gran actividad física.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM), Subcutánea (SC).

DOSIS: Administrar 3 mg de Pentosan polisulfato sódico por kg de peso corporal, equivalente a 1.2 mL de **AKTIV PRO®** por cada 100 kg de peso, cada semana durante cuatro semanas, lo que constituye un ciclo de tratamiento.

En caso necesario, administrar un nuevo ciclo cada 3, 6 o 12 meses, dependiendo de la respuesta del paciente, las condiciones clínicas en que se encuentre y la frecuencia de eventos de alto rendimiento.

El aumento de la dosis no causará una mejor o más rápida respuesta.

ADVERTENCIAS:
- No se administre en conjunto con fármacos anticoagulantes.
- **Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Caja con 4 frascos de 5 mL c/u

Número de registro Q-7692-308

CARPROFEN®

Carprofeno 70 mg/mL

Antiinflamatorio no esteroidal

SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
CARPROFEN® está indicado para el tratamiento del dolor e inflamación asociados a la osteoartritis, cirugía ortopédica y de tejidos blandos.

ESPECIES DE DESTINO:
Equinos: Adultos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa lenta (IV).

DOSIS:
Administrar 0.7 mg de carprofeno / kg de peso corporal cada 24 horas, equivalente a 1 mL de **CARPROFEN®** por cada 100 kg de peso.

La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- No usar en animales con úlcera gastrointestinal.
- Evitar su uso en animales con enfermedad cardiaca, hepática o renal.
- **Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
3 frascos con 1 g de omeprazol c/u y 3 frascos con 10 mL de diluyente c/u

Número de registro Q-7692-306

EUGASTRIL EQ®

Omeprazol 1 g

Inhibidor de la bomba de protones

POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
EUGASTRIL EQ® está indicado para el tratamiento y prevención de úlceras gástricas y duodenales, gastritis erosiva, esofagitis, gastritis provocada por fármacos antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales, y en todos aquellos estados de hipersecreción gástrica.

ESPECIES DE DESTINO:
Equinos: adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa lenta (IV).

DOSIS: Administrar 0.5 a 2 mg de omeprazol por kg de peso corporal, equivalente a 1 mL de **EUGASTRIL EQ®** por cada 50 - 200 kg de peso, cada 24 horas. En caso de presentarse gastroenteritis hemorrágica, puede aplicarse cada 12 horas.

La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- Prohibido su uso en equinos destinados para consumo humano.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- No administrar en potros menores a 4 semanas de edad.
- Una vez reconstituido el producto, deseche el sobrante inmediatamente después de su uso.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



Número de registro Q-7692-313

FIROCOX EQ®

TECNOLOGÍA ODS Orodispersable

Firocoxib 50 mg

Antiinflamatorio no esteridal

TABLETAS FRACCIONABLES



INDICACIONES:
FIROCOX EQ® está indicado para el control del dolor (crónico y agudo) e inflamación de todas las afecciones del sistema musculoesquelético, sinovitis, tendinitis y claudicaciones asociadas con la osteoartritis. De igual forma actúa como coadyuvante en casos de cirugías de tejidos blandos, ortopédicas y dentales, así como para el alivio de cualquier tipo de dolor visceral.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos: adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO).

DOSIS: Administrar 0.1 mg de firocoxib por cada kg de peso corporal (PC). Equivalente a 1 tableta de **FIROCOX EQ®** por cada 500 kg de peso, cada 24 horas, de 7 a 14 días.
La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

MODO DE ADMINISTRACIÓN: Una vez calculada la dosis, deposite la tableta en la boca del caballo justo entre la comisura de los labios y los dientes premolares inferiores; cierre la boca y espere unos 40 segundos a que la tableta sea degradada en la cavidad bucal (ver instructivo).

ADVERTENCIAS:
- Prohibido su uso en equinos destinados para consumo humano.
- No administrar **FIROCOX EQ®** con otros AINE´s.
- El tratamiento con **FIROCOX EQ®** no debe exceder los 14 días.
- No administrar **FIROCOX EQ®** si hay presencia de ulceración del tracto gastrointestinal.
- Evitar la administración de **FIROCOX EQ®** con los alimentos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
10 frascos
de 10 mL c/u

Número de registro Q-7692-181

FLUNIXIN®

Flunixin de Meglumina 55 mg/mL

Analgésico, antipirético y antiinflamatorio no esteroidal

SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
FLUNIXIN está indicado en procesos inflamatorios, dolor y pirexia. En trastornos dolorosos de tejidos blandos, como el asociado a dolor visceral provocado por Síndrome Abdominal Agudo (cólico equino). También, utilizado para aliviar el dolor en problemas del aparato musculoesquelético.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular (IM) e intravenosa lenta (IV).

DOSIS:
Administrar 1.1 mg de flunixin de meglumina por kg de peso corporal. Equivalente a 1 mL de **FLUNIXIN** por cada 50 kg de peso.

La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- No administrar por más de 5 días, en caso de exceder este periodo se puede presentar irritación gástrica y ulceración.
- No administre más de 10 mL de **FLUNIXIN** por sitio de aplicación.
- **Prohibido su uso en equinos destinados para consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Frasco
de 20 mL

Número de registro Q-7692-309

HEMOTAM®

Etamsilato 250 mg/mL

Hemostático

SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
HEMOTAM® está indicado para prevenir y controlar las hemorragias provocadas por procesos quirúrgicos. En traumatismos que produzcan sangrado tanto interno como externo.

ESPECIES DE DESTINO:
Equinos: adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa (IV) o Intramuscular (IM).

DOSIS:
Administrar de 5 a 10 mg de etamsilato por kg de peso corporal (PC). Equivalente a 2 mL de **HEMOTAM®** por cada 50 a 100 kg de peso, como dosis única o cada 24 horas hasta por 3 días.

La dosis e intervalos de administración se pueden repetir a consideración del criterio del Médico Veterinario y dependiendo de la severidad del caso.

ADVERTENCIAS:
- Se puede presentar reacción inflamatoria leve en la zona de aplicación.
- No administrar más de 20 mL de **HEMOTAM®** por vía intramuscular en el mismo sitio de inyección.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- **Prohibido el uso en equinos destinados al consumo humano.**

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Frasco
de 50 mL

Número de registro Q-7692-301

KARBAMOL®

Metocarbamol 200 mg/mL

Relajante muscular

SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
KARBAMOL® es un relajante del músculo esquelético utilizado como coadyuvante en el tratamiento de espasmos musculares agudos y crónicos derivados de esfuerzo prolongado o de actividad física extenuante; traumas o como tratamiento alterno en trastornos del sistema muscular que cursen con tetania.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos. Adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta (IV).

DOSIS:
Condiciones moderadas: Administrar 4.4 - 22 mg de metocarbamol por kg de peso corporal, equivalente de 2.2 a 11 mL de **KARBAMOL®** por cada 100 kg de peso, cada 24 horas.
Condiciones severas: Administrar 22 - 55 mg de metocarbamol por kg de peso corporal, equivalente de 11 a 27 mL de **KARBAMOL®** por cada 100 kg de peso, cada 24 horas.
La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- No utilizar en hembras gestantes.
- Prohibido su uso en equinos destinados para consumo humano.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Caja con 2 jeringas de 36 mL c/u

Número de registro Q-7692-302

KARBAMOL® *Pasta*

Metocarbamol 416 mg/mL

Relajante muscular

PASTA ORAL

INDICACIONES:
KARBAMOL® PASTA es un relajante del músculo esquelético utilizado como coadyuvante en el tratamiento de espasmos musculares agudos y crónicos derivados de esfuerzo prolongado o de actividad física extenuante; traumas o como tratamiento alterno en trastornos del sistema muscular que cursen con tetania.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos. Adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO).

DOSIS: Caballos: 11 mg de metocarbamol por kg de peso corporal. Equivalente a 2 mL de **KARBAMOL® PASTA** por cada 75 kg de peso cada 24 horas. Se recomienda no exceder de 5 g de metocarbamol por individuo al día, equivalente a no más de 12 mL de **KARBAMOL® PASTA** cada 24 horas.
En pacientes con convulsiones, puede emplearse metocarbamol inyectable como tratamiento coadyuvante, a dosis de 40 a 300 mg/kg de peso corporal, siempre bajo estricta vigilancia médica.

La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- No administrar en hembras gestantes.
- No exceder de 5 g de metocarbamol por individuo al día.
- **Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
Caja con 2 jeringas de 36 mL c/u

Número de registro Q-7692-305

MIRAN® *Pasta*

Gabapentina 333 mg/mL

Analgésico y Anticonvulsivo

PASTA ORAL

INDICACIONES:
MIRAN® PASTA está indicado para el tratamiento de trastornos que cursan con dolor neuropático o crónico, donde el uso de AINES está contraindicado de forma prolongada. Se recomienda como terapia adjunta en epilepsia, convulsiones, y para contrarrestar el dolor en laminitis

ESPECIES DE DESTINO: Equinos. Adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO).

DOSIS: Administrar 5 a 20 mg de gabapentina por kg de peso corporal, cada 8, 12 o 24 horas. Equivalente a 1 mL de **MIRAN® PASTA** por cada 16.5 a 66 kg de PC. De 7.5 mL a 30 mL de **MIRAN® PASTA** por cada 500 kg de PC.
La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- La eficacia clínica de **MIRAN® PASTA** debe ser monitoreada y reajustar la dosis dependiendo de la respuesta del paciente.
- El uso en pacientes con insuficiencia renal deberá ser supervisado por el médico veterinario.
- **Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.**
- No administrar en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

ALPHA CHEM®

REALIDAD: La Disfunción de la Parte Intermedia de la Pituitaria (DPIP) provoca una degeneración lenta y progresiva de las neuronas responsables de asegurar el adecuado funcionamiento del circuito hormonal.



PRESENTACIÓN:
Tarro con
90 tabletas

Número de registro Q-7692-312

PERLIDE®

Pergolida 1 mg / tableta

Agonista de los receptores de dopamina



TABLETAS FRACCIONABLES

INDICACIONES:
PERLIDE® está indicado para el control de la Disfunción de la Pars Intermedia de la Pituitaria (DPIP), antes conocida como Enfermedad de Cushing Equino.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos: adultos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral (PO).

DOSIS:
Administrar 2 microgramos de pergolida por cada kg de peso corporal, cada 24 horas, equivalente a 1 tableta de **PERLIDE®** por cada 500 kg de peso corporal.

Tabla de dosificación

Peso corporal (kg)	Dosis: 2 mcg/kg
250	0.5 tableta
500	1 tableta
750	1.5 tabletas
1000	2 tabletas

Después de 4 a 6 semanas, dependiendo de la respuesta clínica individual la dosis puede ajustarse gradualmente sin exceder los 4 mcg/kg/día. Se prevé que, para esta enfermedad, será necesario el tratamiento a lo largo de toda la vida.

ADVERTENCIAS:
- No administrar en equinos menores a 2 años.
- Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
5 frascos con 2 g de cefepime c/u y 5 frascos con 10 mL de diluyente c/u

Número de registro Q-7692-304

TETRACEF® EQ

Cefepime 2 g

Antibiótico de amplio espectro

POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
TETRACEF® EQ está indicado para el tratamiento de infecciones simples y complicadas en padecimientos infecciosos de vías respiratorias altas y bajas, gastrointestinales, intraabdominales, urinarias, del aparato reproductor, infecciones de la piel y musculoesqueléticas. **TETRACEF® EQ** se recomienda en el tratamiento de placentitis equina, septicemia neonatal equina y meningitis.

ESPECIES DE DESTINO: Equinos: adultos y potros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta (IV).

DOSIS:
Potros: administrar 11 mg de cefepime / kg de peso corporal (PC), equivalente a 5.5 mL de **TETRACEF® EQ** por cada 100 kg de PC; cada 8 a 12 h, durante 7 días.

Adultos: administrar 2.2 mg de cefepime / kg de PC, equivalente a 1.1 mL de **TETRACEF® EQ** por cada 100 kg de PC; cada 8 a 12 h, durante 7 días.

La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.

ADVERTENCIAS:
- **Prohibido su uso en equinos destinados para el consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

ALPHA CHEM®



PRESENTACIÓN:
4 Frascos
de 3 mL c/u

Número de registro Q-7692-303

VILAIN®

Acetónido de triamcinolona 6 mg/mL

Antiinflamatorio esteroidal

SUSPENSIÓN INYECTABLE

INDICACIONES:
VILAIN® es un antiinflamatorio esteroidal indicado para el tratamiento de las condiciones inflamatorias crónicas y agudas en articulaciones, piel, desórdenes alérgicos y dermatológicos.

ESPECIE DE DESTINO: Equinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intraarticular (IA), intramuscular (IM), subcutánea (SC).

DOSIS:
Intraarticular (IA): 6 - 18 mg por articulación, se puede repetir el tratamiento después de 3 a 4 días.
Intramuscular (IM) y Subcutánea (SC): 0.01 - 0.05 mg/kg de peso corporal. Equivalente de 1 a 5 mL de **VILAIN®** por cada 600 kg de peso corporal.

La dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario.


ADVERTENCIAS:
- No administrar más de 20 mg por equino.
- No usar en pacientes que cursen con laminitis.
- **Prohibido su uso en equinos destinados al consumo humano.**
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

CONTACTO:
ventasequinos@alphachem.com.mx
+52 56 6225 4524

ALPHACHEM®

...¡ la calidad la hacemos todos los días !



alphachemequinos

alphachem.oficial

Para más información ingresa en **www.alphachem.mx**