

Antibiótico para el tratamiento de infecciones simples y complicadas

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-107 y 110



ALPHACEF® 1g
Cefixime

FORMULA: Cada frasco con polvo contiene: cefixime..... 1 y 2.5 g
Excipiente cbp..... 20 g
Para diluir a 50 mL, una vez preparada la suspensión oral cada mL contiene: cefixime..... 20 y 50 mg

ESPECIES: Cánidos domésticos

DESCRIPCIÓN: El cefixime es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro y resistente a las β-lactamasas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: ALPHACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de los sistemas respiratorio alto y bajo, gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, piel, endocarditis bacteriana y otras infecciones causadas por gérmenes susceptibles al cefixime.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS: 5 mg de cefixime/Kg de peso corporal. Equivalente a 0.25 mL de Alphacef (1g) por Kg de peso corporal o 0.1 mL de Alphacef 2.5 por kg de peso corporal. Cada 12 hrs durante 7 a 14 días dependiendo de la severidad del caso y de las indicaciones del médico veterinario.

PRESENTACIONES: Frasco con 1 y 2.5 de cefixime, cbp 20 g polvo total para reconstituir a 50 mL.

ALPHACEF 2.5® 2.5g

Polvo para preparar Suspensión oral



CYCLOSUPRIM® Ciclosporina

5% 10%

FORMULA: Cada mL contiene: Ciclosporina..... 50 y 100 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: La ciclosporina es un agente inmunosupresor natural producido por el hongo *Beauveria nivea*.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CYCLOSUPRIM® está indicado en el tratamiento de la dermatitis atópica y otras afecciones de la piel como fístula perianal, lúpus eritematoso, algunas afecciones de péñfigo, adenitis sebácea, alopecia felina adquirida y como coadyuvante en la colitis ulcerosa.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se sugiere administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.

DOSIS: Dermatitis atópica. Administrar una dosis total de 5 mg de ciclosporina por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de CYCLOSUPRIM® 5% por Kg de peso corporal o 0.05 mL de CYCLOSUPRIM® 10% por Kg de peso corporal. La dosis deberá dividirse en dos tomas por día durante 30 días o hasta observarse la reducción de los signos clínicos característicos. Con base en el criterio del médico veterinario y la respuesta clínica del paciente, la frecuencia y/o la dosis de administración puede ser modificada al mínimo necesario para mantener el efecto deseado.

PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL de solución con 50 y 100 mg/mL de ciclosporina y pipeta dosificadora.

Solución oral



NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-104 y 108

¡ Fórmula que hace la diferencia !

Enfermedad autoinmune oftálmica

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-109



CYCLOSUPRIM® Oftálmico Ciclosporina

2%

FORMULA: Cada mL contiene: Ciclosporina..... 20 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: CYCLOSUPRIM® Oftálmico contiene ciclosporina, un agente inmunosupresor natural producido por el hongo *Beauveria nivea*.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CYCLOSUPRIM® Oftálmico está indicado para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca crónica (QSC), queratitis superficial crónica (pannus) y blefarconjuntivitis atópica en perros y gatos, así como agente estimulador en la producción de lágrima.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oftálmica.

DOSIS: Durante la fase de inducción administrar 2 veces al día una gota en el ojo afectado hasta que disminuya la descarga ocular, aumente la claridad de la córnea y se incrementen los valores de la prueba lagrimal de Schirmer. Los pacientes en general son mantenidos de por vida con CYCLOSUPRIM® Oftálmico 1 ó 2 veces al día dependiendo de la respuesta al tratamiento.

PRESENTACIONES: Frasco gotero con 10 mL.

Solución oftálmica



COCCIPLAN PE® Toltrazuril

5%

FORMULA: Cada mL contiene: Toltrazuril..... 50 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: El toltrazuril es un derivado triazolinónico con acción coccidicida y antiprotozoaria.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: COCCIPLAN PE® está indicado en el tratamiento de diarreas causadas por protozoarios y por parásitos del género *Eimeria*.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Cánidos y felinos: se recomienda administrar 20 mg de toltrazuril por Kg de peso corporal, equivalente a 0.4 mL de COCCIPLAN PE® por Kg de peso corporal.

Se puede medicar como dosis única o repetir el tratamiento a los 14 ó 21 días posteriores a la primera toma, de acuerdo al criterio del médico veterinario tratante.

PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL de suspensión con 50 mg/mL de toltrazuril y pipeta dosificadora.

Suspensión oral



NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-112

Acción Coccidicida y Antiprotozoaria

TETRACEF® Cefepime

100 mg 250 mg 500 mg

FORMULA: Cada frasco con polvo contiene: Cefepime..... 100, 250 y 500 mg
Cada frasco con diluyente contiene: Agua grado inyectable..... 1, 2.5 y 5 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación de amplio espectro. Su particular estructura le hace una molécula resistente a la acción de las β-lactamasas

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TETRACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de las vías respiratorias altas y bajas, aparato genitourinario, aparato gastrointestinal, musculoesqueléticas, septicemia bacteremia, meningitis y piel. Así como en profilaxis quirúrgica.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.

DOSIS: En cánidos y felinos domésticos la dosis de cefepime es de 20 mg/Kg de peso corporal cada 8 a 12 horas, la duración del tratamiento dependerá de la severidad del caso y del criterio del médico veterinario tratante.

PRESENTACIONES: Cajas con 10 frascos con 100 mg y 10 frascos con diluyente. Cajas con 8 frascos con 250 mg y 8 frascos con diluyente. Cajas con 4 frascos con 500 mg y 4 frascos con diluyente.

Solución inyectable



Cefalosporina de 4ª generación con actividad potenciada contra G(+) y G(-)

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-106

Hemostático, no trombogénico

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-112



HEMOSYLAT® Etamsilat

FORMULA: Cada frasco con solución contiene: Etamsilat..... 125 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: Es un agente antihemorrágico y angioprotector que promueve la interacción endotelio-plaquetaria reduciendo el tiempo de sangrado.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: HEMOSYLAT® está indicado en profilaxis quirúrgicas, procedimientos de emergencia, úlceras sangrantes, profilaxis dental, procedimientos quirúrgicos en tejidos altamente vascularizados, enfermedades infecciosas que causen hemorragias, en caso de hematuria, hematemesis, melena, epistaxis y gingivorragia, en casos de abdomen agudo y pacientes politraumatizados.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular (IM) e Intravenosa (IV).

DOSIS: Administrar 10 mg de etamsilat por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.08 mL de HEMOSYLAT® por Kg de peso corporal.

Días de tratamiento: a criterio del médico veterinario; de uno a tres días o hasta conseguir el efecto deseado. En procedimientos quirúrgicos, administrar HEMOSYLAT® media hora antes.

PRESENTACIONES: Caja con 10 frascos de 2 mL con 250 mg de etamsilat c/u.

Solución inyectable



EUGASTRIL® Omeprazol

FORMULA: Cada frasco con liofilizado contiene: Omeprazol sódico equivalente a omeprazol..... 10 mg
Vehículo cbp (frasco con diluyente)..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Capaz de inhibir la secreción ácido-gástrica durante su estado basal o en condiciones de estimulación.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: EUGASTRIL® está indicado en el tratamiento de trastornos ácido pépticos como úlcera gastroduodenal, úlcera gástrica benigna, erosiones gastroduodenales inducidas por antiinflamatorios.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa

DOSIS: La dosis es de 1 mg de omeprazol por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de EUGASTRIL® por cada Kg de peso corporal. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.

PRESENTACIONES: EUGASTRIL® Caja con 5 frascos con 10 mg de omeprazol liofilizado y 5 frascos con 1 mL de diluyente.

Polvo liofilizado inyectable



Prevención y tratamiento de la secreción ácido gástrica

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-105



Antiemético, excelente para el tratamiento vómito y náuseas

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-103



EMETRON® Ondansetrón

FORMULA: Cada mL contiene: Ondansetrón..... 2 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: EMETRON® es un antiemético con acción antagonista y selectiva de los receptores serotoninérgicos 5-HT₂, el más importante en el estímulo del vómito, localizado en una zona quimiorreceptora del sistema nervioso central y en las fibras nerviosas periféricas.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: EMETRON® está indicado como tratamiento de las náuseas y vómito provocado por padecimientos de origen infeccioso, metabólicos, tóxicos e inflamatorios, principalmente gastroenteritis, enfermedad del páncreas y riñón.

También está indicado para la prevención y control de náuseas y vómito postquirúrgico; así como los inducidos por tratamientos quimioterapéuticos y en pacientes que no han respondido satisfactoriamente a otros fármacos antieméticos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.

DOSIS: En cánidos y felinos la dosis es de 0.1 a 0.2 mg de Ondansetrón por Kg de peso corporal, equivalente a administrar 0.05 a 0.1 mL de EMETRON® por cada Kg de peso corporal cada 8 a 12 hrs., según la severidad del caso. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.

PRESENTACIONES: EMETRON® Caja con 10 frascos de 1 mL, con 2 mg de Ondansetrón.

Solución inyectable



Levotiroxina, el reemplazo hormonal tiroideo de elección

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-101 y 102



TRIOXIL® Levotiroxina sódica 200 mcg 500 mcg 800 mcg 1000 mcg

FORMULA: Cada mL de solución contiene: Levotiroxina sódica..... 1 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

Cada tableta contiene: Levotiroxina sódica... 200 mcg, 500 mcg y 800 mcg
Excipiente cbp... 1 tableta

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: La levotiroxina sódica es un análogo sintético de la hormona tiroidea.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: TRIOXIL® provee una terapia de reemplazo en todas las condiciones que causan una inadecuada producción de hormona tiroidea (hipotiroidismo) en cánidos y felinos domésticos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS: Cánidos: iniciar con una dosis de levotiroxina de 20-22 mcg por Kg de peso corporal cada 12 horas.

Felinos: 50 a 100 mcg de levotiroxina por gato al día. La dosis y frecuencia de la administración debe ser regida y ajustada con base en los signos clínicos, niveles de TSH y T₄ en la sangre.

PRESENTACIONES: Frasco con 60 mL (1 mg/mL), inserto y pipeta dosificadora. Frascos con 100 tabletas de 200, 500 y 800 mcg.

Solución oral y tabletas



LEIDOFs® Gabapentina

100 mg 400 mg

FORMULA: Cada tableta contiene: Gabapentina..... 100 y 400 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

DESCRIPCIÓN: Es un analgésico y anticonvulsivo eficaz en el manejo del dolor neuropático crónico y convulsiones.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEIDOFs® tabletas está indicado como analgésico en el tratamiento de dolor crónico en enfermedades como: osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis y cáncer; como analgésico pre y post quirúrgico. En el tratamiento de problemas neurológicos como anticonvulsivo.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Cánidos Analgésico: 2.5-10 mg/Kg, PO cada 8 a 24 h. | Anticonvulsivo: 10-30 mg/Kg, PO cada 8 a 24 h.

Felinos Analgésico: 5-10 mg/Kg, PO cada 8 a 24 h. | Anticonvulsivo: 5-10 mg/Kg, PO cada 8 a 12 h.

PRESENTACIONES: Caja con frasco de 90 tabletas fraccionables de 100 y 400 mg.

Tabletas fraccionables



Requiere receta médica cuantificada

Analgésico | Anticonvulsivo a nivel neuronal

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-124 y 126

Más que un condroprotector... Modificador estructural del cartilago articular



CINETIC FLEX® Pentosán polisulfato sódico

3% 6%

FORMULA: Cada mL contiene: Pentosán polisulfato sódico..... 30 y 60 mg
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos domésticos

DESCRIPCIÓN: El pentosán polisulfato sódico es un disacárido polisulfatado y es considerado un fármaco modificador de las condiciones patológicas de la osteoartritis.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CINETIC FLEX® está indicado en el control de padecimientos osteoartíticos en perros. Su capacidad para regular el catabolismo del cartilago mejora la salud y la estabilidad de la articulación a través de diferentes mecanismos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular y subcutánea.

DOSIS: Administrar 3 mg de pentosán polisulfato por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de CINETIC FLEX® 3% por cada Kg de peso corporal o 0.05 mL de CINETIC FLEX® 6% por cada Kg de peso corporal por vía intramuscular o subcutánea cada 5-7 días por cuatro aplicaciones (1 ciclo).

Es necesario administrar 4 dosis para completar un ciclo con intervalo de 5-7 días entre cada una. La duración del efecto de cada ciclo depende de la respuesta de cada paciente y la gravedad del caso determinado por el médico tratante, debiendo realizar un ciclo cada 3, 6 o 12 meses.

PRESENTACIONES: CINETIC FLEX® 3% cajas con 4 frascos con 1 mL c/u. CINETIC FLEX® 6% cajas con 4 frascos con 2 mL c/u.

Solución inyectable



CRONVAL HD® Pimobendan

1.25 mg 5 mg

FORMULA: Cada tableta contiene: Pimobendan..... 1.25 y 5 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta

ESPECIES: Cánidos domésticos

DESCRIPCIÓN: El pimobendan es un potente fármaco con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CRONVAL HD® está indicado para el tratamiento de la falla cardiaca congestiva generalmente causada por la enfermedad valvular cardiaca crónica y la cardiomiopatía dilatada en perros.

CRONVAL HD® puede utilizarse como monoterapia o en combinación con diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: Administrar por vía oral una dosis total de 0.5 mg/Kg de peso corporal, equivalente a 1 tableta de 1.25 mg para 2.5 Kg de peso corporal y 1 tableta de 5 mg para 10 Kg de peso corporal. Esta dosis puede ser dividida en dos tomas (mañana y tarde) no es necesario que sean exactamente iguales. Administrar al menos una hora antes del alimento.

Días de tratamiento: dependen del criterio del médico veterinario.

PRESENTACIONES: Caja con frasco de 60 tabletas fraccionables de 1.25 y 5 mg.

Tableta fraccionable y palatable



Acción dual: Vasodilatador e inotrópico positivo

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-135 y 137



CLINDAMICINA | Clindamicina

50 mg 100 mg 150 mg

FORMULA: Cada tableta contiene: Clindamicina HCl..... 50, 100 y 150 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las lincomicinas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: CLINDAMICINA está indicada para el tratamiento de heridas infectadas, abscesos, prostatitis, osteomielitis, septicemias, infecciones del aparato respiratorio, gastrointestinal, hepatobiliares, periodontales y como profilaxis en procedimientos quirúrgicos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSES: Cánidos felinos domésticos: 5 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas durante 10 días, en caso de osteomielitis podrá aumentarse la dosis a 10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.

Tabletas recubiertas




DOXICICLINA | Doxiciclina

50 mg 100 mg 150 mg

FORMULA: Cada tableta contiene: Doxiciclina hidrato..... 50, 100 y 150 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las tetraciclinas.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: DOXICICLINA es el tratamiento de primera elección para el control de la ehrlichiosis canina y felina.
Está indicada para el tratamiento de infecciones del sistema digestivo, sistema respiratorio, enfermedades de la piel e infecciones del sistema urogenital.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSES: Cánidos y felinos domésticos: 5-10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.

Tabletas recubiertas

Tabletas recubiertas



Smart Kinetics

Tecnología en vehículos y excipientes con características especiales que permiten mejorar la actividad terapéutica aún en los fármacos de uso frecuente.

Tableta fraccionable



Rápida desintegración oral
i fácil y seguro de dosificar!

MELOXICAM | Meloxicam

1 mg 2 mg 4 mg



FORMULA: Cada tableta contiene: Meloxicam..... 1, 2 y 4 mg
Excipiente cbp..... 1 tableta
ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos
DESCRIPCIÓN: El meloxicam es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: MELOXICAM está indicado en el tratamiento sintomático de la osteoartritis, problemas de columna (hernias de disco), para analgesia perioperatoria, como antiinflamatorio y antieudativo en problemas respiratorios.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSES: Cánidos: 0.2 mg/Kg de peso corporal el primer día, seguida por 0.1 mg/Kg de peso corporal los siguientes días del tratamiento.
Felinos: 0.2 mg/Kg de peso corporal el primer día, seguida de 0.1 mg/Kg de peso corporal.
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 100 tabletas fraccionables de desintegración oral de 1, 2 y 4 mg.

Tabletas fraccionables, palatables y de rápida desintegración oral

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético selectivo a COX-2

www.alphachem.mx



#AlphaChemTeAcompaña

ALPHACHEM

Alpha Chem, S.A. de C.V. Carr. México - Toluca 1725 E4, Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, CDMX. 05110
Tel: (55) 5515 5228 / (55) 3004 2696
info@alphachem.com.mx



¿Desea saber más de nuestros productos?

¡ NUEVO LANZAMIENTO !

SILDAN HP | Sildenafil

50 mL 10 mg 20 mg

FORMULA: Cada mL contiene: Citrato de sildenafil equivalente a... 10 / 20 mg de sildenafil
Excipiente cbp..... 1 tableta
FORMULA: Cada mL contiene: Citrato de sildenafil equivalente a... 5 mg de sildenafil
Vehículo cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos domésticos
DESCRIPCIÓN: El sildenafil es un derivado de pirazolopirimidinona biodisponible por vía oral, estructuralmente relacionado con el zaprinast, con actividades vasodilatadoras y potencialmente antiinflamatorias.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HP) en diversas enfermedades pulmonares y cardíacas, primarias o secundarias como pueden ser:
G1.- Hipertensión arterial idiopática; derivaciones cardíacas congénitas como la persistencia del conducto arterioso (DSA y DSV).
G2.- Miocardiopatía dilatada; enfermedad valvular mitral mixomatosa. No implementar tratamiento si se observa insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) grave.
G3.- Colapso traqueal; broncomalacia; enfermedad pulmonar intersticial y eosinofílica; neumonía por *Pneumocystis canis* y *Ehrlichia canis*.
G4.- Embolos, trombos y tromboembolias pulmonares agudas o crónicas.
G5.- Infestación por *Dirofilaria immitis* / *Angiostrongylus vasorum*.
G6.- Masas que comprimen las arterias pulmonares (neoplasia, granuloma fúngico); síncope de esfuerzo sin causa aparente (síndrome braquicefálico).

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSES: Administrar de 1 a 4 mg de sildenafil por cada Kg de peso corporal cada 12 horas.

Equivalente a:

- 1 mL de SILDAN HP® SUSPENSIÓN por cada 1.25 a 5 kg de peso corporal
- Una tableta de SILDAN HP® 10 por cada 2.5 a 10 kg de peso corporal
- Una tableta de SILDAN HP® 20 por cada 5 a 20 kg de peso corporal

Dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.

PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL (5 mg/mL) y pipeta dosificadora.

Frascos con 60 tabletas de 10 y 20 mg.



NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-201, 202 Y 207

Reductor de la Resistencia Vascular Pulmonar

LEIDOFs Solución | Gabapentina

50 mL

FORMULA: Cada mL contiene: Gabapentina..... 50 mg
Excipiente cbp..... 1 mL

ESPECIES: Cánidos y felinos domésticos

Consulta: DOSIS COMPLETAS (analgésico y anticonvulsivo)



Ansiolítico, Analgésico y Anticonvulsivo a nivel neuronal.

DESCRIPCIÓN: Actualmente la gabapentina se ha utilizado para el tratamiento de dolor neuropático, epilepsia refractaria y como tranquilizante en gatos para facilitar su manejo durante la consulta médica.
Existe evidencia científica sobre el uso de gabapentina a dosis de 5 mg/kg como estimulante del apetito post quirúrgico en gatos.
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: LEIDOFs Solución se utiliza como:
Ansiolítico: en felinos domésticos ayuda a mejorar el manejo en la consulta veterinaria.
Analgésico: en el tratamiento de dolor crónico y neuropático en enfermedades como osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis, cáncer y como analgésico post quirúrgico.
Anticonvulsivo: en el tratamiento de problemas neurológicos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSES: Felinos domésticos
Ansiolítico: Para el manejo físico en consulta médica. Administrar 20 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, de 2 a 3 horas antes de la consulta veterinaria.
Equivalentes a 0.4 mL de LEIDOFs Solución por cada kg de peso corporal.
Cánidos domésticos
Dolor neuropático: Administrar de 5 a 10 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, cada 12 h. Equivalente a 1 mL de LEIDOFs Solución por cada 3.33 a 10 kg de peso corporal.
En caso necesario aumentar la dosis gradualmente hasta 40 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 8 a 12 h.
Equivalentes a 1 mL de LEIDOFs Solución por cada 1.25 kg de peso corporal.

La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco con 50 mL y pipeta dosificadora.



Solución oral

Consulta: DOSIS COMPLETAS (analgésico y anticonvulsivo)



¡ NUEVA PRESENTACIÓN !



PEQUEÑAS ESPECIES

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉDICOS VETERINARIOS

GUIA RÁPIDA DE PRODUCTOS

ALPHACHEM

