


**Antibiótico para el tratamiento de infecciones simples y complicadas**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-107 y 110



**ALPHACEF®** | **Cefixime** | 1 g

**FÓRMULA:** Cada frasco con polvo contiene:  
 cefixime..... 1 y 2.5 g  
 Excipiente cbp..... 20 g  
 Para diluir a 50 mL, una vez preparada la suspensión oral cada mL contiene:  
 cefixime..... 20 y 50 mg


**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El cefixime es una cefalosporina de tercera generación de amplio espectro y resistente a las β-lactamasas.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** ALPHACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de los sistemas respiratorio alto y bajo, gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético, piel, endocarditis bacteriana y otras infecciones causadas por gérmenes susceptibles al cefixime.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral  
**DOSIS:** 5 mg de cefixime/Kg de peso corporal. Equivalente a 0.25 mL de Alphacef (1g) por Kg de peso corporal o 0.1 mL de Alphacef 2.5 por kg de peso corporal. Cada 12 hrs durante 7 a 14 días dependiendo de la severidad del caso y de las indicaciones del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 1 y 2.5 de cefixime, cbp 20 g polvo total para reconstituir a 50 mL.

**ALPHACEF 2.5®** | 2.5 g

**Polvos para preparar Suspensión oral**

**Prevencción y tratamiento de la secreción ácido gástrica**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-105



**EUGASTRIL®** | **Omeprazol**

**FÓRMULA:** Cada frasco con liofilizado contiene:  
 Omeprazol sódico equivalente a omeprazol..... 10 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL  
 (frasco con diluyente)..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, capaz de inhibir la secreción ácido-gástrica durante su estado basal o en condiciones de estimulación.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** EUGASTRIL® está indicado en el tratamiento de trastornos ácido pépticos como úlcera gastroduodenal, úlcera gástrica benigna, erosiones gastroduodenales inducidas por antiinflamatorios.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa.  
**DOSIS:** 1 mg de omeprazol por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de EUGASTRIL® por cada Kg de peso corporal. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.  
**PRESENTACIONES:** EUGASTRIL® Caja con 5 frascos con 10 mg de omeprazol liofilizado y 5 frascos con 1 mL de diluyente.

**CYCLOSUPRIM®** | **Ciclosporina** | 5% | 10%


**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Ciclosporina..... 50 y 100 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** La ciclosporina es un agente inmunosupresor natural producido por el hongo *Beauveria nivea*.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** CYCLOSUPRIM® está indicado en el tratamiento de la dermatitis atópica y otras afecciones de la piel como fístula perianal, lupus eritematoso, algunas afecciones de pénfigo, adenitis sebácea, alopecia felina adquirida y como coadyuvante en la colitis ulcerosa.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Se sugiere administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.  
**DOSIS:** Dermatitis atópica. Administrar una dosis total de 5 mg de ciclosporina por Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de CYCLOSUPRIM® 5% por Kg de peso corporal o 0.05 mL de CYCLOSUPRIM® 10% por Kg de peso corporal. La dosis deberá dividirse en dos tomas por día durante 30 días o hasta observarse la reducción de los signos clínicos característicos. Con base en el criterio del médico veterinario y la respuesta clínica del paciente, la frecuencia y/o la dosis de administración puede ser modificada al mínimo necesario para mantener el efecto deseado.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 50 mL de solución con 50 y 100 mg/mL de ciclosporina y pipeta dosificadora.

**Solución oral**


**¡ Fórmula que hace la diferencia !**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-104 y 108



**Enfermedad autoinmune oftálmica**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-109



**CYCLOSUPRIM® Oftálmico** | **Ciclosporina** | 2%

**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Ciclosporina..... 20 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** CYCLOSUPRIM® Oftálmico contiene ciclosporina, un agente inmunosupresor natural producido por el hongo *Beauveria nivea*.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** CYCLOSUPRIM® Oftálmico está indicado para el tratamiento de la queratoconjuntivitis seca crónica (QSC), queratitis superficial crónica (pannus) y blefarconjuntivitis atópica en perros y gatos, así como agente estimulador en la producción de lágrima.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oftálmica.  
**DOSIS:** Durante la fase de inducción administrar 2 veces al día una gota en el ojo afectado hasta que disminuya la descarga ocular, aumente la claridad de la córnea y se incrementen los valores de la prueba lagrimal de Schirmer. Los pacientes en general son mantenidos de por vida con CYCLOSUPRIM® Oftálmico 1 ó 2 veces al día dependiendo de la respuesta al tratamiento.  
**PRESENTACIONES:** Frasco gotero con 10 mL.

**Solución oftálmica**

**COCCIPLAN PE®** | **Toltrazuril** | 5%


**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Toltrazuril..... 50 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El toltrazuril es un derivado triazínico con acción coccidicida y antiprotozoaria.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** COCCIPLAN PE® está indicado en el tratamiento de diarreas causadas por protozoarios y por parásitos del género *Eimeria*.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Caninos y felinos: se recomienda administrar 20 mg de toltrazuril por Kg de peso corporal, equivalente a 0.4 mL de COCCIPLAN PE® por Kg de peso corporal.  
 Se puede medicar como dosis única o repetir el tratamiento a los 14 ó 21 días posteriores a la primera toma, de acuerdo al criterio del médico veterinario tratante.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 50 mL de suspensión con 50 mg/mL de toltrazuril y pipeta dosificadora.

**Suspensión oral**

**Acción Coccidicida y Antiprotozoaria**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-112



**EMETRON®** | **Ondansetrón**


**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Ondansetrón..... 2 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** EMETRON® es un antiemético con acción antagonista y selectiva de los receptores serotoninérgicos 5-HT<sub>2</sub>, el más importante en el estímulo del vómito, localizado en una zona quimiorreceptora del sistema nervioso central y en las fibras nerviosas periféricas.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** EMETRON® está indicado como tratamiento de las náuseas y vómito provocado por padecimientos de origen infeccioso, metabólicos, tóxicos e inflamatorios, principalmente gastroenteritis, enfermedad del páncreas y riñón.  
 También, está indicado para la prevención y control de náuseas y vómito postquirúrgico; así como los inducidos por tratamientos quimioterapéuticos y en pacientes que no han respondido satisfactoriamente a otros fármacos antieméticos.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa.  
**DOSIS:** En caninos y felinos la dosis es de 0.1 a 0.2 mg de Ondansetrón por Kg de peso corporal, equivalente a administrar 0.05 a 0.1 mL de EMETRON® por cada Kg de peso corporal cada 8 a 12 hrs., según la severidad del caso. La duración del tratamiento la establecerá el médico veterinario tratante.  
**PRESENTACIONES:** EMETRON® Caja con 10 frascos de 1 mL, con 2 mg de Ondansetrón.

**Solución inyectable**

**Antiemético, excelente para el tratamiento de vómito y náuseas**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-103



**HEMOSYLAT®** | **Etamsilato**


**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Etamsilato..... 125 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** Es un agente hemostático y angioprotector que promueve la interacción endotelio-plaquetaria reduciendo el tiempo de sangrado.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** HEMOSYLAT® está indicado en profilaxis quirúrgicas, procedimientos de emergencia, úlceras sangrantes, profilaxis dental, procedimientos quirúrgicos en tejidos altamente vascularizados, enfermedades infecciosas que causen hemorragias, en caso de hematuria, hematemesis, melena, epistaxis y gingivorragia, en casos de abdomen agudo y pacientes politraumatizados.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular (IM) e Intravenosa (IV).  
**DOSIS:** Administrar 10 mg de etamsilato por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.08 mL de HEMOSYLAT® por Kg de peso corporal.  
 Días de tratamiento: a criterio del médico veterinario; de uno a tres días o hasta conseguir el efecto deseado. En procedimientos quirúrgicos, administrar HEMOSYLAT® media hora antes.  
**PRESENTACIONES:** Caja con 10 frascos de 2 mL con 250 mg de etamsilato c/u.

**Solución inyectable**

**Hemostático, no trombogénico**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-112



**TETRACEF®** | **Cefepime** | 100 mg | 250 mg | 500 mg


**FÓRMULA:** Cada frasco con polvo contiene:  
 Cefepime..... 100, 250 y 500 mg  
 Cada frasco con diluyente contiene:  
 Agua grado inyectable..... 1, 2.5 y 5 mL respectivamente

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación de amplio espectro. Su particular estructura la hace una molécula resistente a la acción de las β-lactamasas  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** TETRACEF® está indicado en el tratamiento de infecciones simples y complicadas de piel, vías respiratorias altas y bajas, genitourinarias, gastrointestinales e intraabdominales, musculoesqueléticas, septicemia, bacteremia, meningitis, entre otras.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intravenosa.  
**DOSIS:** Administrar 20 mg/Kg de peso corporal cada 8 a 12 horas, la duración del tratamiento dependerá de la severidad del caso y del criterio del médico veterinario tratante.  
**PRESENTACIONES:** Cajas con 10 frascos con 100 mg y 10 frascos con diluyente. Cajas con 8 frascos con 250 mg y 8 frascos con diluyente. Cajas con 4 frascos con 500 mg y 4 frascos con diluyente.

**Solución inyectable**


**Cefalosporina de 4a generación con actividad potenciada contra G(+) y G(-)**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-106



**Levotiroxina, reemplazo hormonal tiroideo de elección**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-101 y 102



**TRIOXIL®** | **Levotiroxina sódica** | 200 mcg | 500 mcg | 800 mcg | 1000 mcg

**FÓRMULA:** Cada mL de solución contiene:  
 Levotiroxina sódica..... 1 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

Cada tableta contiene:  
 Levotiroxina sódica... 200 mcg, 500 mcg y 800 mcg  
 Excipiente cbp... 1 tableta

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** La levotiroxina sódica es un análogo sintético de la hormona tiroidea.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** TRIOXIL® provee una terapia de reemplazo en todas las condiciones que causan una inadecuada producción de hormona tiroidea (hipotiroidismo) en caninos y felinos domésticos.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral  
**DOSIS:** Caninos: iniciar con una dosis de levotiroxina de 20-22 mcg por Kg de peso corporal cada 12 horas. Felinos: 50 a 100 mcg de levotiroxina por gato al día. La dosis y frecuencia de la administración debe ser rigida y ajustada con base en los signos clínicos, niveles de TSH y T4 en la sangre.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 60 mL (1 mg/mL), y pipeta dosificadora. Frascos con 100 tabletas de 200, 500 y 800 mcg.

**Solución oral y tabletas**

**Requiere receta médica cuantificada**

**LEIDOFs®** | **Gabapentina** | 100 mg | 400 mg


**FÓRMULA:** Cada tableta contiene:  
 Gabapentina..... 100 y 400 mg  
 Excipiente cbp..... 1 tableta

**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** Es un analgésico y anticonvulsivo eficaz en el manejo del dolor neuropático crónico y convulsiones.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** LEIDOFs® tabletas está indicado como analgésico en el tratamiento de dolor crónico en enfermedades como: osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis y cáncer; como analgésico pre y post quirúrgico. En el tratamiento de problemas neurológicos como anticonvulsivo.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Caninos Analgésico : 5-10 mg/kg , PO cada 8a 24 h | Anticonvulsivo : 10-20 mg/kg , PO cada 6 a 12 h. Felinos Analgésico : 5-10 mg/kg , PO cada 8a 24 h | Anticonvulsivo : 10-20 mg/kg , PO cada 6 a 12 h Ansioilótico (ver Leidofs solución)  
**PRESENTACIONES:** Caja con frasco de 90 tabletas fraccionables de 100 y 400 mg.

**Tabletas fraccionables**

**Analgésico, Anticonvulsivo a nivel neuronal y Ansioilótico**


NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-124 y 126



**Requiere receta médica cuantificada**

**Más que un condroprotector... Modificador estructural del cartilago articular**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-131 y 132



**CINETIC FLEX®** | **Pentosán polisulfato sódico** | 3% | 6%

**FÓRMULA:** Cada mL contiene:  
 Pentosán polisulfato sódico..... 30 y 60 mg  
 Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El pentosán polisulfato sódico es un disacárido polisulfatado y es considerado un fármaco modificador de las condiciones patológicas de la osteoartritis.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** CINETIC FLEX® está indicado en el control de padecimientos osteoartíticos en perros. Su capacidad para regular el catabolismo del cartilago mejora la salud y la estabilidad de la articulación a través de diferentes mecanismos.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Intramuscular y subcutánea.  
**DOSIS:** Administrar 3 mg de pentosán polisulfato por cada Kg de peso corporal, equivalente a 0.1 mL de CINETIC FLEX® 3% por cada Kg de peso corporal o 0.05 mL de CINETIC FLEX® 6% por cada Kg de peso corporal por vía intramuscular o subcutánea cada 5-7 días por cuatro aplicaciones (1 ciclo). Es necesario administrar 4 dosis para completar un ciclo con intervalo de 5-7 días entre cada una. La duración del efecto de cada ciclo depende de la respuesta de cada paciente y la gravedad del caso determinado por el médico tratante, se recomienda un ciclo cada 3, 6 o 12 meses.  
**PRESENTACIONES:** CINETIC FLEX® 3% cajas con 4 frascos con 1 mL c/u. CINETIC FLEX® 6% cajas con 4 frascos con 2 mL c/u.

**Solución inyectable**

**CRONVAL HD®** | **Pimobendan** | 1.25 mg | 5 mg


**FÓRMULA:** Cada tableta contiene:  
 Pimobendan..... 1.25 y 5 mg  
 Excipiente cbp..... 1 tableta

**ESPECIES:** Caninos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El pimobendan es un potente fármaco con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** CRONVAL HD® está indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva, generalmente causada por la enfermedad valvular mitral mixomatosa (EVM) y la cardiomiopatía dilatada en perros.  
**CRONVAL HD®** puede utilizarse como monoterapia o en combinación con diuréticos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Administrar por vía oral una dosis total de 0.5 mg/Kg de peso corporal, equivalente a 1 tableta de 1.25 mg para 2.5 Kg de peso corporal y 1 tableta de 5 mg para 10 Kg de peso corporal. Esta dosis puede ser dividida en dos tomas (mañana y tarde) no es necesario que sean exactamente iguales. Administrar al menos una hora antes del alimento.  
 Días de tratamiento: dependen del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Caja con frasco de 60 tabletas fraccionables de 1.25 y 5 mg.

**Tableta fraccionable**

**Acción dual: Vasodilatador e Inotrópico positivo**

NÚMERO DE REGISTRO: Q-7692-135 y 137



**CLINDAMICINA** | Clindamicina



50 mg 100 mg 150 mg

**FÓRMULA:** Cada tableta contiene: Clindamicina HCl..... 50, 100 y 150 mg  
Excipiente cbp..... 1 tableta  
**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las lincomicinas.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** CLINDAMICINA está indicada para el tratamiento de heridas infectadas, abscesos, prostatitis, osteomielitis, septicemias, infecciones del aparato respiratorio, gastrointestinal, hepato biliares, periodontales y como profilaxis en procedimientos quirúrgicos.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Caninos felinos domésticos: 5 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas durante 10 días, en caso de osteomielitis podrá aumentarse la dosis a 10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.  
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.



**DOXICICLINA** | Doxiciclina




50 mg 100 mg 150 mg

**FÓRMULA:** Cada tableta contiene: Doxiciclina hclato..... 50, 100 y 150 mg  
Excipiente cbp..... 1 tableta  
**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** La doxiciclina es un antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de las tetraciclinas.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** DOXICICLINA es el tratamiento de primera elección para el control de la ehrlichiosis canina y felina.  
Está indicada para el tratamiento de infecciones del sistema digestivo, sistema respiratorio, enfermedades de la piel e infecciones del sistema urogenital.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Caninos y felinos domésticos: 5-10 mg/Kg de peso corporal cada 12 horas.  
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 100 tabletas recubiertas de 50, 100 y 150 mg.



Tabletas recubiertas



**Smart Kinetics**

Tecnología en vehículos y excipientes con características especiales que permiten mejorar la actividad terapéutica aún en los fármacos de uso frecuente.

Tableta fraccionable



Rápida desintegración oral i fácil y seguro de dosificar!

**MELOXICAM** | Meloxicam



1 mg 2 mg 4 mg

**FÓRMULA:** Cada tableta contiene: Meloxicam..... 1, 2 y 4 mg  
Excipiente cbp..... 1 tableta  
**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El meloxicam es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** MELOXICAM está indicado en el tratamiento sintomático de la osteoartritis, problemas de columna (hernias de disco), para analgesia perioperatoria, como antiinflamatorio y antiedematoso en problemas respiratorios.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** 0.2 mg/kg de peso corporal el primer día, seguida de 0.1 mg/kg de peso corporal los siguientes días del tratamiento.  
Dosis y días de tratamiento, depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 100 tabletas fraccionables de desintegración oral de 1, 2 y 4 mg.



Antiinflamatorio, analgésico y antipirético selectivo a COX-2

**¡ NUEVO LANZAMIENTO !**

**SILDAN HP®** | Sildenafil

50 mL 10 mg 20 mg

**FÓRMULA:** Cada tableta contiene: Citrato de sildenafil equivalente a... 10, 20 mg de sildenafil  
Excipiente cbp..... 1 tableta  
**FÓRMULA:** Cada mL contiene: Citrato de sildenafil equivalente a... 5 mg de sildenafil  
Vehículo cbp..... 1 mL

**ESPECIES:** Caninos domésticos  
**DESCRIPCIÓN:** El sildenafil es un derivado de pirazolopirimidinona biodisponible por vía oral, estructuralmente relacionado con el zaprinast, con actividades vasodilatadoras, inhibidor de la fosfodiesterasa 5, reduce la resistencia vascular pulmonar.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** Tratamiento de la hipertensión pulmonar (HP) en diversas enfermedades pulmonares y cardíacas, primarias o secundarias como pueden ser:  
G1.- Hipertensión arterial idiopática; derivaciones cardíacas congénitas como la persistencia del conducto arterioso (DSA y DSV).  
G2.- Miocardiopatía dilatada; enfermedad valvular mitral mixomatosa. No implementar tratamiento si se observa insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) grave.  
G3.- Colapso traqueal; broncomalacia; enfermedad pulmonar intersticial y eosinofílica; neumonía por *Pneumocystis canis* y *Ehrlichia canis*.  
G4.- Émbolos, trombos y tromboembolias pulmonares agudas o crónicas.  
G5.- Infestación por *Dirofilaria immitis* / *Angiostrongylus vasorum*.  
G6.- Masas que comprimen las arterias pulmonares (neoplasia, granuloma fúngico); síncope de esfuerzo sin causa aparente (síndrome braquicefálico).  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Administrar de 1 a 4 mg de sildenafil por cada Kg de peso corporal cada 12 horas.  
Equivalente a:  
- 1 mL de SILDAN HP® SUSPENSIÓN por cada 1.25 a 5 kg de peso corporal  
- Una tableta de SILDAN HP® 10 por cada 2.5 a 10 kg de peso corporal  
- Una tableta de SILDAN HP® 20 por cada 5 a 20 kg de peso corporal  
Dosis y días de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 50 mL (5 mg/mL) y pipeta dosificadora. Frasco con 60 tabletas fraccionables de 10 y 20 mg.



Reductor de la Resistencia Vascular Pulmonar

**LEIDOFs® Solución** | Gabapentina

50 mL

**FÓRMULA:** Cada mL contiene: Gabapentina..... 50 mg  
Excipiente cbp..... 1 mL  
**ESPECIES:** Caninos y felinos domésticos

Consulta: DOSIS COMPLETAS (analgésico y anticonvulsivo)



**DESCRIPCIÓN:** Actualmente la gabapentina se ha utilizado para el tratamiento de dolor neuropático, epilepsia refractaria y como tranquilizante en gatos para facilitar su manejo durante la consulta médica.  
Existe evidencia científica sobre el uso de gabapentina a dosis de 5 mg/kg como estimulante del apetito post quirúrgico en gatos.  
**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:** LEIDOFs® Solución se utiliza como:  
**Ansiofórico:** en felinos domésticos ayuda a mejorar el manejo en la consulta veterinaria.  
**Analgésico:** en el tratamiento de dolor crónico y neuropático en enfermedades como osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis, cáncer y como analgésico post quirúrgico.  
**Anticonvulsivo:** en el tratamiento de problemas neurológicos.  
**VIA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.  
**DOSIS:** Felinos domésticos  
**Ansiofórico:** Para el manejo físico en consulta médica.  
Administrar 20 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, de 2 a 3 horas antes de la consulta veterinaria.  
En caso necesario aumentar la dosis gradualmente hasta 40 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 8 a 12 h.  
**Dolor neuropático:** Administrar de 5 a 10 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, cada 12 h.  
Equivalente a 1 mL de LEIDOFs® Solución por cada 3.33 a 10 kg de peso corporal.  
Equivalente a 0.4 mL de LEIDOFs® Solución por cada kg de peso corporal.  
Equivalente a 1 mL de LEIDOFs® Solución por cada 1.25 kg de peso corporal.  
La dosis y días de tratamiento, dependen de la severidad de la enfermedad y del criterio del médico veterinario.  
**PRESENTACIONES:** Frasco con 50 mL y pipeta dosificadora.

Su venta requiere receta médica cuantificada



Solución oral

Consulta: DOSIS COMPLETAS (analgésico y anticonvulsivo)



**¡ NUEVA PRESENTACIÓN !**

www.alphachem.mx



#AlphaChemTeAcompaña

ALPHACHEM®

Alpha Chem, S.A. de C.V. Carr. México - Toluca 1725 E4, Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa, CDMX. 05110  
Tel: (55) 5515 5228 / (55) 3004 2696  
info@alphachem.com.mx



¿Desea saber más de nuestros productos?



**PEQUEÑAS ESPECIES**

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉDICOS VETERINARIOS

GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS

ALPHACHEM®

