

LEIDOFs® SOLUCIÓN

NÚMERO DE REGISTRO Q-7692-205

GABAPENTINA
50 mg/mL

Medicación en Casa / Medicación Hospitalaria
Solución oral

*La siguiente información es para uso
exclusivo del médico veterinario:*



Frasco con 50 mL (felinos)



Frasco con 50 mL (cánidos)

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Gabapentina...	50 mg
Vehículo cbp...	1 mL

Presentación comercial: frasco con 50 mL con dosificador tipo jeringa de polietileno.

DESCRIPCIÓN:

La gabapentina o ácido 2-[1-(aminometil) ciclohexil]-acético; está relacionada estructuralmente con el neurotransmisor GABA (ácido gammaaminobutírico) e interactúa con las sinapsis GABA. Actualmente la gabapentina se ha utilizado para el tratamiento de dolor neuropático, epilepsia refractaria y como tranquilizante en gatos para facilitar su manejo durante la consulta médica. Existe evidencia científica sobre el uso de gabapentina a dosis de 5 mg/kg como estimulante del apetito post quirúrgico en gatos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

LEIDOFs® SOLUCIÓN se utiliza como analgésico en el tratamiento del dolor crónico y neuropático en enfermedades como osteoartritis, artritis, otitis, dermatitis, cáncer y como analgésico post quirúrgico. Como anticonvulsivo en el tratamiento coadyuvante de problemas neurológicos. Como ansiolítico en felinos domésticos ayuda a mejorar el manejo en la consulta veterinaria.

ESPECIES DE DESTINO:

Caninos y felinos domésticos.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La acción de la gabapentina se debe a su unión a la subunidad $\alpha 2-\delta$ de los canales de calcio dependientes de voltaje (VDCCs) tipo L presinápticos, esta unión disminuye el flujo de calcio, resultando en la inhibición de los neurotransmisores excitatorios como sustancia P, glutamato y norepinefrina, entre otros. Por lo anterior la gabapentina tiene efecto analgésico y previene la alodinia (sensación de dolor resultante de un estímulo normal no nocivo) o hiperalgia (respuesta exagerada a un estímulo doloroso).

FARMACOCINÉTICA:

La gabapentina es bien absorbida por vía oral, esto ocurre en el intestino delgado por procesos de transporte activo mediado por transportadores de aminoácidos de baja capacidad principalmente expresados en la primera porción del intestino delgado. La administración de gabapentina con el alimento incrementa ligeramente el área bajo la curva (AUC).

En perros la biodisponibilidad es alrededor del 80%. La concentración máxima plasmática se observa a las dos horas post-administración. La gabapentina es parcialmente metabolizada en *N*- metilgabapentina; con una vida media de eliminación de 2 a 4 horas. La vía de eliminación primaria es la renal.

En gatos la gabapentina es bien absorbida con una biodisponibilidad promedio del 90%. La concentración máxima es alcanzada a la hora y media; su vida media de eliminación es de 2.8 horas, similar a la observada en perros.

La gabapentina no es metabolizada significativamente la mayoría es excretada sin cambios por la vía urinaria.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral (PO)

DOSIS:

Cánidos domésticos

Dolor neuropático: dosis inicial de 5 a 15 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 12 h, equivalente a un mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada 3.3 a 10 kg de peso corporal en caso necesario aumentar la dosis gradualmente hasta 40 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 8 a 12 h, equivalente a 1 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada 1.25 kg de peso corporal.

Anticonvulsivo: administrar de 10 a 20 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 8 h, equivalente a 1 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada 2.5 a 5 kg de peso corporal.

Felinos domésticos

Dolor neuropático: administrar de 5 a 10 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, cada 12 h, equivalente a 0.5 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada 2.5 a 5 kg de peso corporal.

Ansiolítico: para el manejo físico en consulta médica; administrar 20 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, de 2 a 3 horas antes de la consulta veterinaria, equivalente a 0.4 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada kg de peso corporal.

Anticonvulsivo: administrar de 5 a 10 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal, cada 12 h, equivalente a 0.5 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada 2.5 a 5 kg de peso. Para controlar las convulsiones, en algunos gatos la dosis puede ser aumentada hasta 20 mg de gabapentina por cada kg de peso corporal cada 8 a 12 h, equivalente a 0.4 mL de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** por cada kg de peso corporal.

La dosis y días de tratamiento dependen de la enfermedad que se trate y del criterio del Médico Veterinario.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:

Los antiácidos orales disminuyen la biodisponibilidad de la gabapentina en un 20%; si fuera necesaria la administración de antiácidos se deberá administrar con un intervalo de separación de por lo menos dos horas.

La administración de opioides combinados con gabapentina potencializa los efectos, por lo que se recomienda utilizar la dosis mínima.

TOXICIDAD / SOBREDOSIS:

Los signos de una sobredosis principalmente son consistentes con los efectos adversos que implican la depresión del SNC. El tratamiento de la sobredosis accidental por gabapentina es sintomática y de soporte.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos que pudieran presentarse son leves y reversibles al disminuir la dosis.

La ataxia y sedación son los efectos adversos más comunes que se presentan en pequeñas especies. Otros efectos adversos que pudieran presentarse son aquellos relacionados con el sistema gastrointestinal como diarrea.

Para reducir los efectos adversos de la gabapentina se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja, e ir aumentando según la requiera el paciente.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar si el paciente es alérgico a la gabapentina o cualquier otro ingrediente en la fórmula.

PRECAUCIONES / EFECTOS REPRODUCTIVOS:

Al utilizar **LEIDOFs® SOLUCIÓN** en terapia como analgésico, la dosis se debe ir disminuyendo paulatinamente, ya que el paciente puede experimentar dolor severo, si se interrumpe la terapia de forma abrupta.

Al utilizar **LEIDOFs® SOLUCIÓN** en terapia como anticonvulsivo, debe evitarse suspender la terapia repentinamente, ya que los episodios pueden llegar a presentarse a los pocos días de haber discontinuado el tratamiento.

Es recomendable empezar por la dosis mínima y dependiendo del progreso del paciente, puede aumentarse hasta la dosis máxima.

Se debe informar al propietario que existe un mayor riesgo de posibles caídas por los efectos sedantes de la gabapentina, el paciente debe permanecer bajo supervisión después de la administración para evitar algún incidente.

En pacientes con insuficiencia renal debe de valorarse su uso y de ser así empezar por la dosis mínima.

PANAMÁ 

En caso de presentar efectos adversos deberá disminuir la dosis. Tome en cuenta que al aumentar o disminuir la dosis debe esperar un cierto tiempo dependiendo de la respuesta del paciente para valorar la eficacia del cambio de dosis.

A la fecha no se han realizado estudios sobre los efectos en la gestación de perros y gatos, sin embargo, ha mostrado efectos teratogénicos en ratones, ratas y conejos, por lo que se recomienda evitar su uso en periodos de gestación.

ADVERTENCIAS:

- La eficacia clínica de **LEIDOFs® SOLUCIÓN** debe ser monitoreada y ajustar la dosis dependiendo de la respuesta del paciente.
- El uso en pacientes con insuficiencia renal deberá ser supervisado por el Médico Veterinario.
- No administrar en conjunto con antiácidos.
- Se debe informar al propietario de posibles caídas por los efectos sedantes de la gabapentina, el paciente debe permanecer bajo supervisión.
- No se administre en animales alérgicos a los componentes de la fórmula.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Almacenar a no más de 30 °C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz.
- Exclusivamente para uso veterinario.
- Disponga de forma correcta de los residuos y recipientes del producto, acorde a la normatividad de cada región.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO**

PANAMÁ 



www.leidofs.alphachem.mx



Hecho en México por:
Alpha Chem, S.A. de C.V.
Carr. México - Toluca 1725 Local E-4,
Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa,
Ciudad de México CP 05110
Tel: (55) 3004 2696

Contáctenos en nuestras redes sociales



facebook.com/alphachemoficial



instagram.com/alphachem.oficial

Visite nuestro sitio web

www.alphachem.mx

Descargue nuestra App



V01 - Panamá